The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT 2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(금) ~ 22일(토)

장소: 제주해비치호텔



주최 _ 대한뇌혈관내치료의학회 주관 대한신경외과학연구재단



인사말



존경하는 대한뇌혈관내치료의학회 회원 여러분

안녕하십니까?

지난 4년간 지겹게 기승을 부리던 COVID-19가 지나 가고 올해는 완전한 일상으로의 회복을 기대했지만, 다시 여러가지 복잡한 의료계의 현안들로 주변 상황이 여느 때와 달라 많은 혼란과 어려움으로 다소 위축되는 기분도 듭니다. 의료 현안 관련 미래가 예측이 되지 않는 현재, 특히 저희 회원 여러 분들의 몸과 마음이 지쳐 있을 것으로 생각됩니다.

하지만 언제나 그랬듯이 여러분과 함께 힘을 모아 슬기롭게 이 위기 또한 극복해 나갈 거라는 조심스러운 확신과 간절한 바람입니다.

올해 제주도에서 개최되는 ASCENT 2024는 현재 이러한 저희의 모습과 가장 흡사한 단어라고 생각이 되어 "Patience and Passion"이라는 테마로 정하였습니다.

아직까지 힘든 시기인 만큼 이곳 제주에서 학술적 교류 뿐 아니라 잠시나마 고단함을 잊을 수 있는 편안하고 행복한 시간을 담아 가시길 기원합니다. 어려운 환경에서도 우리 학회를 지금의 자랑스러운 모습으로 성장시켜 주신 회원 여러분께 존경과 감사를 드립니다.

건강한 모습으로 2024년 6월 제주도에서 뵙기를 고대합니다.

2023~2025 14대 대한뇌혈관내치료의학회 임원진

상임이사

현장 권순찬 물산대학교병원 부회장 부석규 순천향대학교 서울병원 추석규 순천향대학교 서울병원 추석규 차이고대학교 반산병원 학술 김대곤 차이고대학교 반산병원 전설 차이고대학교 반산병원 전설 차이고대학교 분당차병원 산송훈 차이고대학교 보장병원 전설 자이고대학교 보장병원 전설 자이고대학교 보장병원 전설 가톨릭대학교 부천성모병원 건형우 가톨릭대학교 부천성모병원 가톨릭대학교 보장성원원원 학중철 물산대학교 보장성원원원 전설 학중철 물산대학교 보장성원원원 전설 전설 전설 전설 전설 전설 전설	직위	성명	소속
부회장 박석규 순천황대학교 서울병원 종무 하성고 고려대학교 안산병원 작술 김대곤 차이과대학교 분당차병원 산승훈 차의과대학교 분당차병원 산승훈 차의과대학교 분당차병원 산승훈 차의과대학교 분당차병원 산상우 조선대학교병원 개물 대한 전상우병원 가물릭대학교 의정부성모병원 가물릭대학교 의정부성모병원 각종철 울산대학교 서울아산병원 산형 전후호 연세대학교 세브란스병원 전후형 전후 전후	 회장	권순찬	울산대학교병원
총무 이성은 고려대학교 안산병원 학술 김태곤 차의과대학교 분당차병원 전책 신승훈 차의과대학교 분당차병원 하상우 조선대학교병원 재무 김훈 가톨릭대학교 부전성모병원 수련교육 김영우 가톨릭대학교 시설문생원 간행 이종명 한김대학교 기통성실병원 간행 이종명 한김대학교 기통성실병원 소통호 인체대학교 세브란스병원 비교육 사울대학교병원 박근영 언세대학교 세브란스병원 이성호 서울대학교병원 학교육 영남대학교병원 이용철 아주대학교병원 학교육 영남대학교병원 학교육 영남대학교병원 학교육 영남대학교병원 청양진 영남대학교병원 청양진 영남대학교병원 청양진 영남대학교병원 청양진 영남대학교병원 소문성 순천량대학교병원 전소성 수천량대학교병원 전문성 보건대학교병원 전문서 기울대학교병원 전문 사용 기울대학교병원 전문 사용 기업보통 전문 사용 기업보통 전문 사용			
학술 김대곤 차인과대학교 본당차병원 신승훈 차인과대학교 본당차병원 하상우 조선대학교병원 재무 김훈 가톨릭대학교 보장보안된 관련교육 김영우 가톨릭대학교 의정부성모병원 한경후 영주호 연세대학교 세브란스병원 전경후 이화여자대학교 서울병원 보급 연세대학교 세브란스병원 보급 연세대학교 세브란스병원 보급 연세대학교 세브란스병원 보급 연세대학교 세브란스병원 이성호 연세대학교 세브란스병원 이성호 서울대학교병원 보급명 인사대학교 세브란스병원 이성호 어울대학교병원 원명철 아주대학교병원 경험호 영남대학교병원 경험호 영남대학교병원 원용철 아주대학교병원 경험로 영남대학교병원 경험로 양남대학교병원 경험로 양대학교병원 전체대학교 세브란스병원 전체대학교 부천정모병원 전체대학교 부천정모병원 경영진 영남대학교병원 정명진 영남대학교병원 전상보 양구현 울산대학교 강릉아산병원 산회섭 강동경희대학교병원 전문자학교 각종양산병원 전문지점 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보・학회사판찬 심숙영 명지성모병원 전로시험 강현송 서울대학교병원 전로시험 강현송 서울대학교 기행인원 조수희 울산대학교 구제성모병원 전문병원 전문병원 전유일 대구고모병원 전유일 대학교 성반센트병원 전용적 이사 (한송자편집) 전대환 원망대학교 성반센트병원			
정책 신승훈 抗외과대학교 본당차병원 해상우 조선대학교병원 재무 김훈 가톨릭대학교 의정부성모병원 관련교육 김영우 가톨릭대학교 의정부성모병원 보충철 울산대학교 서울인원 보충철 울산대학교 전울이산병원 전형 이종명 한림대학교 전불인원 보험 중동명 이화여자대학교 서울병원 보금명 연세대학교 세브란스병원 대외합력 강철훈 영남대학교병원 대외합력 의용철 아주대학교병원 국제교류 박근명 연세대학교 세브란스병원 기용철 이상대학교병원 이상대학교병원 기용적인 영업대학교병원 이상대학교병원 경영진 영남대학교병원 이상대학교병원 경영진 영남대학교 구로병원 영지 경영진 영남대학교 기료원원 신통성 순천향대학교 부천병원 전산정보 신통성 순천향대학교 병원 신통성 순천향대학교 병원 전보지지점 오대상 가톨릭대학교 의정부성모병원 전보병원 전로심의 강현송 서울대학교병원 사용대학교병원 전보원 감소연 가톨릭관동대학교 국제성모병원 전보원 감소연 가톨릭관동대학교 국제성모병원 전보원			
하상우 조선대학교병원 기통릭대학교 부천성모병원 기통릭대학교 의정부성모병원 기통리대학교 의정부성모병원 기통리대학교 의정부성모병원 박종혈 울산대학교 서울아산병원 한림대학교 강동성실병원 정준호 연세대학교 세브란스병원 학교형 연세대학교 세브란스병원 학교형 연세대학교 세브란스병원 학교형 연세대학교 세브란스병원 한글에			
재무 김홍 가톨릭대학교 보전성모병원	정책		
수현교육 김영우 가톨릭대학교 의정부성모병원 간행 이종영 한림대학교 강동성심병원 전호호 연세대학교 세브란스병원 설존호 인세대학교 세브란스병원 보험 환경호 인외대학교 세브란스병원 비기합력 장철훈 영남대학교병원 가울호환 연시대학교 세브란스병원 라고대로로 발대학교 반대학교 병원 가톨릭대학교 부천성모병원 경임권 항원리 영남대학교 보원 항구현 울산대학교 강흥아산병원 관상 연기 고려대학교 구로병원 항구현 울산대학교 강흥아산병원 전상적보 신화점 강동경희대학교병원 한분이학회사관한 신화점 가톨릭대학교 의정부성모병원 한보이학회사관한 심숙영 명지성모병원 전보험원 강환승 서울대학교병원 전보험원 강환승 서울대학교병원 전보병원 기통릭대학교 기량이산병원 전보병원 이스포항병원 전우열 대구고모병원 전우열 대구고모병원 전우열 대구고모병원 전우일 대구고모병원 전용적의 전우표성병원 전상적인 전우조성병원 설정적이 이사 (학술지관점원) 전환경상병원			
수현교육 박종철 울산대학교 서울아산병원 간행 이종영 한림대학교 강동성심병원 정준호 연세대학교 세브란스병원 소통영 이화여자대학교 서울병원 박근영 연세대학교 세브란스병원 이성호 서울대학교병원 학원 양살훈 영남대학교병원 연세대학교 세브란스병원 리성림 가톨리대학교병원 경영진 영남대학교병원 양보 오윤원기 교대대학교 구로병원 양구현 양구현 울산대학교 강릉아산병원 전산정보 신통성 순천향대학교 부천병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 전문성 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 전로지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 전로시의 강천승 서울대학교병원 전로심의 강천승 서울대학교병원 전로심의 강천승 月골만동대학교 기생모병원 전문병원 전우열 대구국모병원 전우열 대구국모병원 감하섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술자리집) 김대원 원광대학교병원 생재훈 가톨릭대학교 성반센트병원 성재훈 가톨릭대학교 성반센트병원 성재훈			
간행 이동영 한림대학교 강동성심병원 정준호 연세대학교 세브란스병원 조동영 이화여자대학교 서울병원 박근영 연세대학교 세브란스병원 이상호 서울대학교병원 대외협력 장철훈 영남대학교병원 대외협력 인용철 아주대학교병원 고재교류 박근영 연세대학교 세브란스병원 방침환 연세대학교 세브란스병원 전성림 가톨리대학교병원 정엄진 영남대학교병원 장구현 울산대학교 강릉아산병원 산동성 순천양대학교 부천병원 신동성 순천양대학교 부천병원 천원관리 고통경희대학교병원 전문성 가톨릭대학교 의정부성모병원 전보학회사편찬 실숙영 명지성모병원 전보학회사편찬 실숙영 명지성모병원 전문병원 가톨릭관동대학교 국제성모병원 전문병원 이스포향병원 전우열 대구로모병원 전우일 대구로모병원 정주효성병원 원광대학교병원 설정적 이사 (학술자리집) 김대원 원광대학교병원 설정적 이사 (학술자리집) 김대원 원광대학교병원 설정적 이사 (학술자리집) 김대원 원광대학교병원 설정적 이사 (학술자리집) 김대원 </td <td>수련교육</td> <td></td> <td></td>	수련교육		
보험 정준호 연세대학교 세브란스병원 조동영 이화여자대학교 서울병원 박근영 연세대학교 세브란스병원 이성호 서울대학교병원 장철훈 영남대학교병원 기조리교육 학근영 연세대학교 세브란스병원 국제교류 학근영 연세대학교 부천성모병원 합제윤리 경영진 영남대학교병원 홍보 융원기 고려대학교 구로병원 홍보 양구현 울산대학교 강릉아산병원 전산정보 신통성 순천향대학교 부천병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 전로지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 여의사회 조수희 물산대학교 강릉아난병원 조수희 물산대학교 강릉아난병원 조수희 명지성모병원 전문원 대구굿모닝병원 전우열 대구굿모닝병원 전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 설계 경우토성병원	 가행		
보험 조동영 이화여자대학교 서울병원 박근영 연세대학교 세브란스병원 이성호 서울대학교병원 장혈훈 영남대학교병원 대외협력 임용철 아주대학교병원 국제교류 박근영 면세대학교 세브란스병원 법제윤리 경영진 영남대학교병원 출보 윤원기 고려대학교 구로병원 항구현 울산대학교 강릉아산병원 선동성 순천향대학교 부천병원 전상정보 신통성 순천향대학교 부천병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 전로지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 전로심의 강현승 서울대학교병원 전급심의 강현승 서울대학교병원 전급심의 강환승 서울대학교병원 전문병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 전문병원 대그곳모병병원 전문열 대그곳모닝병원 전우열 대그곳모닝병원 기울리대학교병원 청주효성병원 발생지 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 설계 청주호성병원 발생지 이사 (인증관리) 김대원 원광대학교병원			
보험 박근영 언세대학교 세브란스병원 이성호 서울대학교병원 장철훈 영남대학교병원 임용철 아주대학교병원 국제교류 박근영 연세대학교 세브란스병원 법제윤리 가톨릭대학교 부천성모병원 정영진 영남대학교병원 장후현 울산대학교 구로병원 양구현 울산대학교 강릉아산병원 신동성 순천향대학교 부천병원 신화섭 강동경희대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 전로지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 전료심의 강현승 서울대학교병원 전원원 감소연 가톨릭대학교 국제성모병원 전문병원 김문철 에스포항병원 전우열 대구로모닝병원 감희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성반센트병원 설정적 이사 (인종관리) 김대원 원광대학교 경원			
대외협력	보험		
대외협력 장철훈 영남대학교병원 국제교류 박근영 연세대학교 세브란스병원 법제윤리 가톨릭대학교 부천성모병원 홍보 윤원기 고려대학교 구로병원 홍보 양구현 울산대학교 강릉아산병원 전상정보 신동성 순천향대학교 부천병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 전의사회 김소연 가톨릭관통대학교 국제성모병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 리문철 에스포향병원 전우열 대구굿모닝병원 감희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교 성민센트병원 별정직 이사 (인증관리) 오인호 증앙보훈병원			서울대학교병원
대외협력 임용철 아주대학교병원 국제교류 박근영 연세대학교 세브란스병원 김성림 가톨릭대학교 부천성모병원 정영진 영남대학교병원 용보 유원기 고려대학교 구로병원 응구현 울산대학교 강릉아산병원 신동성 순천향대학교 부천병원 신화섭 강동경희대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 전료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 전료심의 강현승 서울대학교병원 전교심의 강현승 서울대학교병원 전로시의 강현승 기톨릭관동대학교 국제성모병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 김모철 에스포항병원 천문병원 천유열 대구굿모낭병원 전유열 대구굿모낭병원 김연월 대구구모낭병원 김의섭 청주효성병원 발정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원			영남대학교병원
법제윤리 경영진 영남대학교 부천성모병원 경영진 영남대학교병원 영원진 영남대학교병원 영원지 고려대학교 구로병원 응원기 고려대학교 구로병원 양구현 울산대학교 강릉아산병원 신동성 순천향대학교 부천병원 신희섭 강동경희대학교병원 진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 전료시의 강현승 서울대학교병원 기톨릭관동대학교 국제성모병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 전유형 명지성모병원 전유형 연기성모병원 전유형 연기성모병원 전문병원 전우열 대구굿모닝병원 청주효성병원 경의섭 청주효성병원 원광대학교병원 원광대학교병원 경대원 원광대학교병원 경대원 원광대학교병원 경대원 원광대학교병원 경대원 원광대학교병원 원대학교병원 경대원 원광대학교병원 원대학교병원 원대학교병원 경대원 원광대학교병원 원대학교병원 원강대학교병원 경제훈 가톨릭대학교 성반센트병원 중앙보훈병원	대외협력		
정영진 영남대학교병원 응보 윤원기 고려대학교 구로병원 양구현 울산대학교 강릉아산병원 전산정보 신희섭 강동경희대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 전료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 전료심의 강현승 서울대학교병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 검문철 에스포항병원 청주호 명지성모병원 전문병원 전문병원 기울리 경우산병원 김문철 에스포항병원 청주호 명지성모병원 청주호성병원 원명적 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 병정직 이사 (인증관리) 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원	국제교류	박근영	연세대학교 세브란스병원
용보 윤원기 고려대학교 구로병원 양구현 울산대학교 강릉아산병원 신동성 순천향대학교 부천병원 신희섭 강동경희대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 지소연 가톨릭관동대학교 국제성모병원 전의사회 조수희 울산대학교 강릉아산병원 김문철 에스포항병원 전무병원 전우열 대구굿모닝병원 전우열 대구굿모닝병원 경주효성병원 발정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 상재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 설정지 이사 (인증관리)		김성림	가톨릭대학교 부천성모병원
응구현 울산대학교 강릉아산병원 전산정보 신동성 순천향대학교 부천병원 신희섭 강동경희대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 지로심의 강현승 서울대학교병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 지문철 에스포항병원 전문병원 전문병원 전우열 대구굿모닝병원 전우열 대구굿모닝병원 전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 발정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 설정직 이사 (인증관리)	법세윤리	정영진	영남대학교병원
정구현 물산대학교 강릉아산병원 신동성 순천향대학교 부천병원 신희섭 강동경희대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 지물대학교 국제성모병원 전의사회 감소연 가톨릭관동대학교 국제성모병원 조수희 물산대학교 강릉아산병원 김모철 에스포항병원 전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 기톨릭대학교 성빈센트병원 설정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	-	윤원기	고려대학교 구로병원
선산성보 신희섭 강동경희대학교병원 회원관리 고준경 부산대학교병원 진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 지료심의 강현승 가톨릭관동대학교 국제성모병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 검문철 에스포항병원 허준 명지성모병원 전우열 대구굿모낭병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 물정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	옹모	양구현	울산대학교 강릉아산병원
지원관리 고준경 부산대학교병원 진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 인보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 지급심의 강현승 서울대학교병원 지급심의 강현승 가톨릭관동대학교 국제성모병원 조수회 울산대학교 강릉아산병원 김문철 에스포항병원 전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 물정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	TIIITIL	신동성	순천향대학교 부천병원
진료지침 오재상 가톨릭대학교 의정부성모병원 연보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 어의사회 김소연 가톨릭관동대학교 국제성모병원 조수희 울산대학교 강릉아산병원 김문철 에스포항병원 전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 별정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	선산성모	신희섭	강동경희대학교병원
변보·학회사편찬 심숙영 명지성모병원 진료심의 강현승 서울대학교병원 지수의 기톨릭관동대학교 국제성모병원 조수회 울산대학교 강릉아산병원 지원 기문철 에스포항병원 이 전우명 명지성모병원 지수명 대구굿모닝병원 지수명 대구굿모닝병원 지의섭 청주효성병원 기의섭 청주효성병원 기의섭 청구효성병원 기의섭 청구효성병원 기의섭 원광대학교병원 성재훈 기톨릭대학교 성빈센트병원 보정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	회원관리	고준경	부산대학교병원
진료심의 강현승 서울대학교병원	진료지침	오재상	가톨릭대학교 의정부성모병원
여의사회김소연가톨릭관동대학교 국제성모병원조수희울산대학교 강릉아산병원전문병원이스포항병원청준명지성모병원전우열대구굿모닝병원김희섭청주효성병원별정직 이사 (학술지편집)김대원원광대학교병원성재훈가톨릭대학교 성빈센트병원별정직 이사 (인증관리)오인호중앙보훈병원	연보·학회사편찬	심숙영	명지성모병원
여의사회 조수희 울산대학교 강릉아산병원 김문철 에스포항병원 허준 명지성모병원 전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 멸정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	진료심의	강현승	서울대학교병원
조수희 물산대학교 강릉이산병원 기문철 에스포항병원 허준 명지성모병원 전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 김희섭 청주효성병원 김희섭 청구효성병원 김희선 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 보정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	MOLLE	김소연	가톨릭관동대학교 국제성모병원
전문병원허준명지성모병원전우열대구굿모닝병원김희섭청주효성병원별정직 이사 (학술지편집)김대원원광대학교병원성재훈가톨릭대학교 성빈센트병원별정직 이사 (인증관리)오인호중앙보훈병원	어의사외	조수희	울산대학교 강릉아산병원
전우열 대구굿모닝병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 별정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	전문병원	김문철	에스포항병원
선무별 내구굿모당병원 김희섭 청주효성병원 별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 별정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원		허준	명지성모병원
별정직 이사 (학술지편집) 김대원 원광대학교병원 성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 별정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원		전우열	대구굿모닝병원
성재훈 가톨릭대학교 성빈센트병원 별정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원		김희섭	청주효성병원
별정직 이사 (인증관리) 오인호 중앙보훈병원	별정직 이사 (학술지편집)	김대원	원광대학교병원
		성재훈	가톨릭대학교 성빈센트병원
김창현 계명대학교 동산의료원	별정직 이사 (인증관리)	오인호	중앙보훈병원
		김창현	계명대학교 동산의료원

2023~2025 14대 대한뇌혈관내치료의학회 임원진

직위	성명	소속
HITH OUL (CITIZIOUS)	황교준	분당제생병원
별정직 이사 (다기관임상)	김영수	에스포항병원
	윤창환	분당서울대학교병원 순환기내과
심뇌혈관정책	이찬희	영남대학교병원 순환기내과
	옥민수	울산대학교 예방의학과
뇌신경마취	박희평	서울대학교병원 마취통증의학과
의료기기 연구	양수근	인하대학교 의생명학과
	김수아	순천향대학교 천안병원 재활의학과
뇌신경재활	김여형	가톨릭대학교 의정부성모병원 재활의학과
	김기훈	고려대학교 안산병원 재활의학과
	이학승	원광대학교병원 신경과
LI\$FIII G L	정용안	가톨릭대학교 인천성모병원 핵의학과
다학제연구	이아름	순천향대학교 부천병원 영상의학과
	김광준	연세대학교 세브란스병원 노년내과
특별이사 (대외협력)	김범태	순천향대학교 부천병원
특별이사 (WFITN)	신용삼	가톨릭대학교 서울성모병원
특별이사 (정책)	권오기	분당서울대학교병원
특별이사 (연보, 학회사편찬)	고준석	강동경희대학교병원
특별이사 (의학회)	윤석만	순천향대학교 천안병원
특별이사 (신의료기술/장비/재료)	강동훈	경북대학교병원
	최재호	가톨릭대학교 서울성모병원
특별이사 (WFITN 준비이사)	이중구	가톨릭대학교 서울성모병원
특별이사 (회칙관리)	이동훈	가톨릭대학교 성빈센트병원
특별이사 (KSCVS)	이재환	연세대학교 용인세브란스병원
특별이사 (CME)	반승필	분당서울대학교병원
특별이사 (ASTRO)	권현조(회장)	충남대학교병원
국글에서 (ASTRO)	진성철(부회장)	인제대학교 해운대백병원
	장인복	한림대학교 평촌성심병원
	장경술	진주한일병원
	정진영	참포도나무병원
특별이사	조준성	단국대학교병원
	남택균	중앙대학교병원
	장동규	가톨릭대학교 인천성모병원
	백진욱	제주한라병원
	김명진	가천대학교 길병원
광주/전라지회	김대원	원광대학교병원
대구/경북지회	홍대영	에스포항병원

2023~2025 14대 대한뇌혈관내치료의학회 임원진

직위	성명	소속
대전/충청지회	임정욱	세종충남대학교병원
부산/울산/경남지회	최재형	동아대학교병원
인천지회	유찬종	가천대학교 길병원

감사 (2명)

직위	성명	소속
감사	김창현	양산부산대학교병원
	박정현	한림대학교 동탄성심병원

간사 (3명)

직위	성명	소속
회장 간사	김성태	인제대학교 부산백병원
총무 간사	김훈	가톨릭대학교 부천성모병원
학술 간사	김정재	연세대학교 세브란스병원

명예회장 (3명)

직위	성명	소속
명예회장	백민우	인봉의료재단 뉴고려병원
	권도훈	울산대학교 서울아산병원
	김영준	한림대학교 강남성심병원

전임회장단 (10명)

직위	성함	소속
초대, 제2대	백민우	인봉의료재단 뉴고려병원
제3대	김영준	한림대학교 강남성심병원
제4, 5대	권도훈	울산대학교 서울아산병원
제6대	안성기(작고)	(전) 한림대학교 성심병원
제7대	신용삼	가톨릭대학교 서울성모병원
제8대	권오기	분당서울대학교병원
제9대	김범태	순천향대학교 부천병원
제10대	성재훈	가톨릭대학교 성빈센트병원
제11대	고준석	강동경희대학교병원
제12대	윤석만	순천향대학교 천안병원
제13대	장철훈	영남대학교병원



이 아름 순천향대학교 부천병원 영상의학과 부교수

[학력 및 약력]

1999 ~ 2005	순천향대학교 의과대학 의학과 학사
2007 ~ 2009	순천향대학교일반대학원 영상의학 석사학위
2013 ~ 2019	순천향대학교일반대학원 영상의학 박사학위

[약력]

2006.10	호주 Edith Cowan University Australia Medical Board
2007.05 ~ 2011.02	순천향대학교 부천병원 영상의학과 전공의
2011.03 ~ 2012.02	순천향대학교 부천병원 영상의학과 전임의
2012.03 ~ 2013.02	서울대학교병원 영상의학과 임상조교수
2013.02 ~ 2020.02	순천향대학교 부천병원 영상의학과 조교수
2022.08 ~ 2023.09	University of Calgary, Canada, Stroke Center Visiting Professor
2020.02 ~ 현재	순천향대학교 부천병원 영상의학과 부교수

[학회활동]

대한신경영상의학회 수련이사 대한영상의학회 수련간사 한국의료방사선안전관리협회 학술교육이사 대한영상진단협회 학술이사 Korean Society of Magnetic Resolution of Medicine학술지 심사위원



박 희 평 서울대학교병원 마취통증의학과 교수

[학력 및 약력]

1987.3 ~ 1993.2	충북대학교 의학과 학사
1994.3 ~ 1996.8	충북대학교 의학과 석사
2003.3 ~ 2005.8	충북대학교 의학과 박사
1993.3 ~ 1994.2	충북대학교 병원 인턴
1994.3 ~ 1998.2	충북대학교 병원 전공의
1998.3 ~ 2001.4	국군 논산병원 마취과장
2001.5 ~ 2002.4	서울대학교 병원 전임의
2002.5 ~ 2004.2	청주 성모병원 마취과장
2004.3 ~ 2008.2	분당서울대학교병원 임상조교수
2008.3 ~ 2012.2	서울의대 조교수
2012.3 ~ 2017.2	서울의대 부교수
2017.3 ~ 현재	서울의대 교수

[학회활동]

2023년 ~ 현재 대한뇌신경마취학회 부회장



김 기 훈 고려대학교 안산병원 재활의학과 교수

[학력 및 약력]

2000 고려대학교 의학과 의학사

2012 고려대학교 의학과 재활의학 박사

2014 ~ 2019 고려대학교 안산병원 재활의학과 임상교수 2020 ~ 현재 고려대학교 안산병원 재활의학과 교수



서 명 숙 사단법인 제주올레 이사장

[학력]	1980년	고려대학교 교육학과 학사
[약력]	1980 ~ 1983 1985 1987 ~ 1989 1989 ~ 2003 2003 ~ 2005 2005 ~ 2006 2007 2010	기독교사회문제연구원 출판간사 월간 마당 기자 월간 <한국인> 기자 <시사저널> 정치부 기자, 정치부장, 취재 1부장, 편집장 프리랜서 저술가 인터넷신문 <오마이뉴스> 편집국장 산티아고 도보 순례 완주 / 환경재단 '세상을 밝게 만든 100인' 선정 재암문화재단 '재암문화상' 수상 제 1회 '2010 한국관광의 별' 수상
	2011 2012 2013 2014 2017 2019 현재	제 4회 그린시티 공모전 대통령상 수상 교보생명 환경대상 생태대안부문 대상 수상 제 1회 엄홍길 휴먼재단 '휴먼상' 수상 제34회 일가상 '사회공익부문' 수상, 한국 최초 아쇼카 펠로우 선정 제주올레 '제주관광대상' 수상 '국민훈장 동백장' 대통령 훈장 수상 제주올레 '대통령 표창장' 수상 '라이나 50+ 어워즈' 사회공헌 부문 대상 수상 사단법인 제주올레 이사장 한국관광공사 사외이사

[저서] 흡연여성잔혹사(2004)

꼬닥꼬닥 걸어가는 이 길처럼(2010) 놀멍쉬멍걸으멍-제주걷기여행(2011)

식탐(2012)

숨, 나와 마주 서는 순간(2015) 서귀포를 아시나요(2019)



Shinsuke Sato

St. Luke's International Hospital
Chief Physician

Education

Graduated from Kansai Medical University, Faculty of Medicine Doctor of Medicine degree

Professional Experience

2002: Joined Tokyo Women's Medical University Hospital, Department of Neurosurgery

2004: Seconded to Atami Soga Memorial Hospital, Department of Neurosurgery

2005: Seconded to Saiseikai Kuribayashi Hospital, Department of Neurosurgery

2006: Seconded to Tokyo Women's Medical University Affiliated Hachioji Medical Center, Department of Neurosurgery

2008: Seconded to Ushiku Aiwa General Hospital, Department of Neurosurgery

2011: Seconded to Ebina General Hospital, Department of Neurosurgery, promoted to Chief Physician

2012: Assistant Professor, Department of Neurosurgery, Tokyo Women's Medical University

2013: Vice Chief Physician, Department of Neurosurgery, Kobe City Medical Center General Hospital

2015: Vice Chief Physician, Neuroendovascular Therapy Division,

Department of Neurosurgery, St. Luke's International Hospital

2018: Chief Physician, Neuroendovascular Therapy Division,

Department of Neurosurgery, St. Luke's International Hospital

Certifications and Specializations

Certified Neurosurgeon by the Japan Neurosurgical Society

Certified Stroke Specialist by the Japan Stroke Society

Certified Neuroendovascular Therapy Specialist by the Japan Neurosurgical Society

Certified Neuroendovascular Therapy Instructor by the Japan Neurosurgical Society

Certified Surgical Technique Instructor for Cerebrovascular Diseases by the Japan Stroke Society

프로그램

6월 21일 (금)

12:30-13:20	Registration		
	Opening remark	권순찬 (대한뇌혈관내치료의학회 회장)	
13:20-13:30	Welcome remark	권정택 (대한신경외과학회 이사장) 정신 (대한신경외과학회 회장) 안재성 (대한뇌혈관외과학회 회장)	
13:30-14:40	Free Paper I. How to Respond to Cuts in Insurance Payments - Case reports	좌장: 박석규 (순천향대), 정준호 (연세대)	
13:30-13:45	Insurance payment reduction for the flow diverter plus coiling procedure for the recurred large aneurysm	김영우 (가톨릭대 의정부성모병원)	18
13:45-14:00	Regrowing recurrence of the unruptured MCA treated by stent assisted coiling:retreated by Lvis assisted coiling	진성철 (인제대 해운대백병원)	19
14:00-14:15	Cuts in Insurance Payments in Dongtan Sacred Heart Hospital over the past 5 years.	박정현 (한림대 동탄성심병원)	21
14:15-14:30	뇌혈관조영술의 보험청구 및 삭감사례	조동영 (이화여대 서울병원)	22
14:30-14:40	질의응답		
14:40-15:40	Symposium I. Multidisplinary approach for cerebrovascular disease	좌장: 김범태 (순천향대), 권순찬 (울산대)	
14:40-15:00	Ischemic stroke Imaging	이아름 (순천향대 영상의학과)	25
15:00-15:20	Anesthesia during treatment for cerebrovascular disease	박희평 (서울대 마취통증의학과)	26
15:20-15:40	Rehabiliation for cerebrovascular disease	김기훈 (고려대 재활의학과)	35
15:40-16:00	Coffee Break		
16:00-17:00	Free Paper II. 'My first case' from Young Gun	장: 백민우 (뉴고려병원), 이호국 (한림대)	
16:00-16:10	Review of Early Cases: Giant Aneurysms Treated with Coilassisted Flow Diverting Stents	조현준 (고려대 구로병원)	43
16:10-16:20	Three cases of ruptured blood-blister like aneurysms treated with stent-assisted coil embolization using the LVIS EVO: a first-year experience	권민용 (계명대 동산병원)	44
16:20-16:30	Endovascular Treatment (EVT) for Wake-up Acute Ischemic Stroke (AIS) : My first, agonizing experience in my life	박광태 (영남대병원)	45
16.20 16.40			
16:30-16:40	Facing the First Mountain: A Young cerebrovascular surgeon's Case report of Aneurysm treatment	황의현 (의정부을지대병원)	46
16:40-16:50		황 <u>의</u> 현 (의정부을지대병원) 이주환 (인제대 부산백병원)	
	Case report of Aneurysm treatment Flow Diverter as a Rescue Treatment for Ruptured Blood	이주환 (인제대 부산백병원)	47
16:40-16:50	Case report of Aneurysm treatment Flow Diverter as a Rescue Treatment for Ruptured Blood Blister-Like Aneurysm in a Patient with Multiple Medical Issues Overcoming severe aortic tortuosity in endovascular treatment	이주환 (인제대 부산백병원)	47
16:40-16:50 16:50-17:00	Case report of Aneurysm treatment Flow Diverter as a Rescue Treatment for Ruptured Blood Blister-Like Aneurysm in a Patient with Multiple Medical Issues Overcoming severe aortic tortuosity in endovascular treatment of intracranial aneurysm Free Paper III.	이주환 (인제대 부산백병원) 김세운 (울산대병원)	47

17:12-17:24	Flow diverter stent-assisted coil embolization of recurrent basilar artery aneurysm	성승언 (동래봉생병원)	52
17:24-17:36	Delayed collapse of flow diverter after treatment of cervico- petrous ICA giant aneurysm: another concern for flow diversion in giant aneurysms	n 반승필 (분당서울대병원)	53
17:36-17:48	Should Patients With Acute Minor Ischemic Stroke With Isolated Internal Carotid Artery Occlusion Be Thrombolysed?	송승윤 (가톨릭대 성빈센트병원)	54
17:48-18:00	Fetal Bleeds after Flow Diversion for Large-Sized Aneurysms	정영진 (영남대병원)	55
18:00-18:30	General assembly and photo time	하성곤 (대한뇌혈관내치료의학회 총무이사)	
18:30	시상 및 만찬		

6월 22일 (토)

07:00-08:00	아침산책	진행: 권순찬 (대한뇌혈관내치료의학	회 회장), ඊ	남성곤 (대한뇌혈관내치료의학회 총무이사)	
10:00-10:30	대한뇌혈관내치료의학회	연구비 지원사업 공모 발표	좌장:김태	대곤 (차의과학대), 황교준 (분당제생병원)	
10:00-10:07	Clinical Effectiveness of Modification - Multicent	Flow Diverting Stent with Surfa er Retrospective Study	ce	강현승 (서울대병원)	59
10:07-10:14	Korean Subarachnoid Ar	neurysm Trial, KSAT		권순찬 (울산대병원)	65
10:14-10:21	Development of a Novel Acute Ischemic Stroke T	Thrombus Model for Investigation	ng	안홍석 (한림대 강동성심병원)	75
10:21-10:28	Al using Korean Stroke F	Registry		오재상 (가톨릭대 의정부성모병원)	81
10:30-11:30	Free Paper IV. Ecstasy session (Troub	leshooting for difficult cases)		좌장: 권현조 (충남대), 윤석만 (순천향대)	
10:30-10:42	•	-femoral site with difficult femor ny or balloon angioplasty before		김창현 (계명대 동산병원)	89
10:42-10:54		of Freely Floating Retained Arch with Snare during dural AV	F	신승훈 (차의과학대 분당차병원)	90
10:54-11:06		e facial bleeding from pterygoid ct carotid cavernous fistula: A ex us sinus	kpedite	안성열 (화정명지병원)	91
11:06-11:18	Combined Embolization Basilar Top Irregular-sha	Technique with WEB and Coil fo ped Aneurysm	r	정연 구 (성균관대 강북삼성병원)	92
11:18-11:30	Endovascular treatment agony and journey to su	for partially thrombosed aneury mmit	/sm:	이종민 (울산대병원)	93

프로그램

11:30-12:00	Special Lecture	좌장: 신승훈 (차의과학대)	
	느림의 가치 - 제주올레	서명숙 (사단법인 제주올레 이사장)	97
12:00-13:00	Luncheon Symposium I	좌장: 고준석 (경희대), 김영우 (가톨릭대)	
12:00-12:20	Initial Clinical Experience of Pipeline [™] Vantage	김성림 (가톨릭대 부천성모병원)	109
12:20-12:40	The real clinical performance of the Avenir coil tailored for the first coil	Shinsuke Sato (St. Luke's International Hospital)	110
12:40-13:00	Next Neuroprotective agents?	이종민 (울산대병원)	111
13:00-14:00	Symposium II. 지멘스 3D 영상 기술을 통한 DFT Device (WEB/LVIS Evo) Visibility Improvement & Case Discussion	좌장: 신용삼 (가톨릭대), 강현승 (서울대)	
13:00-13:20	The Usefulness of Image Fusion Technique using ARTIS icono for the Evaluation of the WEB Device.	최재호 (가톨릭대 서울성모병원)	121
13:20-13:40	Imaging Protocol and Efforts for Optimal WEB Size Selection	조동영 (이화여대 서울병원)	126
13:40-14:00	PETRA-MRA as a follow-up imaging modality for intracranial aneurysms treated with WEB device	김정재 (연세대 세브란스병원)	139
14:00-14:10	시상 및 Closing remarks	권순찬 (대한뇌혈관내치료의학회 회장)	

≫ KoNES 방사선사/간호사 연수교육

6월 22일 (토)	

제주 해비치호텔 & 리조트 지하1층 다이아몬드홀

08:20-08:25	Registration	
08:25-08:30	Opening remark	권순찬 (대한뇌혈관내치료의학회 회장)
08:30-09:30	Session I. Basics of Anatomy & Devices	
08:30-08:55	Angiography: basic setting and anatomy	신동성 (순천향대 부천병원) 143
08:55-09:00	Q & A	
09:00-09:25	Basic devices for procedures	김소연 (가톨릭관동대 국제성모병원) 144
09:25-09:30	Q & A	
09:30-09:40	Coffee Break	
09:40-10:40	Session II. Imaging, Medication & Cases	
09:40-10:05	Imaging and medication for acute ischemic stroke	심유식 (인하대병원) 159
10:05-10:10	Q & A	
10:10-10:35	Stent retriever or Suction catheter for recanalization	박정현 (한림대 동탄성심병원) 166
10:35-10:40	Q & A	
10:40-12:40	방사선사 보수교육	

E-Poster				
1	Popliteal artery occlusion during mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke	이영섭 (대구굿모닝병원)		
2	Aspiration boosted stent retrieval thrombectomy: personal experience 2 case	강재성 (분당제생병원)		
3	Case report: Treatment of Severe cerebral vasospasm	김현곤 (분당제생병원)		
4	Delayed Coil Migration from Anterior Communicating Aneurysm: A Rare Complication	박민 (유성선병원)		
5	응급 뇌졸중 치료 가이드라인 제정	오재상 (가톨릭대 의정부성모병원)		
6	Carotid artery stenting following CEA in acute stroke by complete ICA atherosclerotic occlusion	박상 규 (연세대 강남세브란스)		
7	Transradial WEB Embolization of a Basilar Tip Aneurysm: A Technical Note and Literature Review	김동섭 (가톨릭대 인천성모병원)		
8	Histological Study of the Normal Vertebral Artery -Hypothetical Induction Site of Dissecting Aneurysms-	김수빈 (순천향대 부천병원)		

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(금) ~ 22일(토)
광소: 제주해비치호텔

Free Paper I

(How to Respond to Cuts in Insurance Payments - Case reports)

6월 21일(금) 13:30-14:40

좌장: 박석규 (순천향대)

정준호 (연세대)

FP1-1

Insurance payment reduction for the flow diverter plus coiling procedure for the recurred large aneurysm

Young Woo Kim, Jae-sang Oh, Min-Jeong Kim

Department of Neurosurgery, College of Medicine, The Catholic University of Korea

Objective: A 38-year-old woman was admitted with a sudden headache followed by stuporous mentality. Initial CTA revealed localized ICH in the temporal lobe and diffuse SAH, caused by the rupture of an anterior choroidal artery aneurysm. She also had an unruptured intracranial artery (ICA) bifurcation aneurysm. Cerebral angiography showed a ruptured large aneurysm at the origin site of the anterior choroidal artery, measuring 12.48mm (long axis) x 11.30mm x 6.85mm (neck), and an unruptured aneurysm at the ICA bifurcation, measuring 3.93mm (long axis) x 3.60mm x 3.14mm (neck).

Methods: Considering the SAH and subsequent open craniotomy, coil embolization using double microcatheters without stent, followed by open craniectomy for hematoma removal and decompression was performed. A second treatment (stent deployment with additional coiling) was carried out simultaneously with treatment for the unruptured ICA bifurcation aneurysm 7 weeks after the initial treatment. A third treatment for major recurrence was performed 1 year later. The measured size of the recanalized portion with contrast filling was approximately 14.12mm x 7.07mm. Considering the previous two treatments, the stenting state, and the need to reduce jet flow, flow diverter deployment plus additional coiling was planned to further reduce recurrence.

Result: Insurance payment was denied for five coils, so we appealed this issue.

Conclusion: Sharing this issue, we can discuss the reasons behind the reduction, and strategies for addressing similar issues in the future.

FP1-2

Regrowing recurrence of the unruptured MCA treated by stent assisted coiling:retreated by Lvis assisted coiling


Sung-Chul Jin

Department of Neurosurgery, Inje University, Haeundae Paik Hospital


Regrowing recurrence of the unruptured MCA treated by stent assisted coiling: retreated by Lvis assisted coiling

Inje University, Haeundae Paik Hospital Sung-Chul Jin

F/61, unruptured MCA aneurysm



단순히 추가적인 코일을 넣는 것만으로 재발된 동맥류 치료시 다시 재발 소견이 높아질 것이라 판단 하였고 이에 혈류 개선 효과를 기대할 수 있는 Lvis 스텐트 보조 코일 색전술을 계획하였음



multiple stent placement를 통한 neck remodeling 및 intra-aneurysmal flow 변화를 통한 thrombosis 유도를 위한 치료

Intery Neuroradiol, 2020 Oct; 26(5): 557–565.

Published online 2020 Aug 23. doi: 10.1177/1591019920952903

PMCID: PMC7645191

Hemodynamic differences by increasing low profile visualized intraluminal support (LVIS) stent local compaction across intracranial aneurysm orifice

 $\label{lem:condition} Zhonghin Tian, ^1Mingoi; Zhang, ^1Gaohui Li, ^2Rongbo Jin, ^2Xiaochang Leng, ^2Ying Zhang, ^1Kun Wang, ^1Yisen Zhang, ^1Xinjian Yang, ^1Jianping Xiang, ^2 and Jian Liu, ^1$

► Author information ► Article notes ► Copyright and License information <u>Disclaimer</u>

심판청구 기각의 이유


청구인이 제출한 전료기록부 등을 검토한 결과, 쟁의인은 UIA, Rt. MCAB에 대해 2015.4월 Stent assisted coil 시행, UIA Lt. MCAB로 2015.10월 Coil 시행, UIA, Lt. Ant. choroidal에 대해 2016.10월 Coil 시행한 자로, r/o Rt. MCAB An. recur에 대해 f/u TFCA 위해 2020.7.9.부터 3일간 청구인 병원에 입원하여 UIA Rt. MCA s/p stemt assisted coil recur로 7.10. "GDC packing with stemt, aneurysm(AN)"을 시행하면서 TARGET DETACHABLE COILS 4×1, LVIS & LVIS JR 1×1' 등을 사용한 사실이 확인 된다. 청구인은 기존의 stent에 더해 multiple stent를 한다면 flow diversion의 effect를 줄 수 있다고 판단하여 close cell에 metal cover가 높은 stent를 사용하여 서술을 진행 하였다고 주장하나, 쟁의인은 치료 후 재발된 경우로, 이번 시술을 통해 coil 삽입술이 충분히 이루어졌고, 기존 스탠트가 동맥류 정부를 리모델링하고 있으므로 추가로 LVIS stent를 사용할 근거가 미약하다고 판단된다.

행정 소송 진행

이 사건 수술이 neck(동맥류 입구)이 4mm 이상이거나, 동맥류 체부의 직경/ 경부의 직경이 2미만인 경우에 해당하지 않아서 이 사건 수술이 기준에 부합 하지 않는다는 의미인지?

재발시에도 동맥류 목의 길이가 4mm을 넘었고 동맥류 체부의 직경/경부의 지경이 2미만이어서 스텐트 보조 코일 색전술의 인 정기준으로 맞습니다. 단지 스텐트 하나가 들어가 있고 동매규가 자라는 재발 형태가 아닌 코일 압축(coil compaction)으로 인한 재발 형태였다면 추가 코일 삽입으로 향후 재발없이 치료 될 수 있을 가능성이 있지만 동맥류 자체가 자라는 경우는 혈류 개선을 시키는 것이 향후 재발이 되지 않게 만드는데 있어 중요한 치료 방법으로 인정되어 지고 있다.

피청구인은 "기존에 스텐트 보호하 색전되어 있던 동맥류의 재발이 확인되어 추가 색전송 시행한 케이스로 기존 스텐트가 동맥류 경부를 리모델링 하고 있어 주가 스텐트 사용 인정할 구가 없으며, 또한 영상자료에 주가 스텐트 확인되지 않는다라고 주장한 것으로 보이는데, 거가 없으며, 또한 영상자료에 주가 스텐트를 시흥한 것이 어나라 기존 스텐트를 리모델링한 것에 불과하기 때문에 주가 스텐트로 인정할 수 없다는 의미인지?



현 재발시에는 기존의 스텐트가 동맥류 목에 리모델링 효과가 있기 때문에 추가 스텐트 삼입술 자체를 인정할 수 없다는 취지이나 우리가 스텐트 추가 사용은 동맥류 목 리모델링 효과를 바라는 것이 아니라 혈류 개선하여 동맥 류 재발을 낮추기 위하여 치료하였기 때문에 시술 불인정 받을 이유가 없습 니자 발음

FP1-3

Cuts in Insurance Payments in Dongtan Sacred Heart Hospital over the past 5 years.

Park Jung Hyun

Department of Neurosurgery, Dongtan Sacred Heart Hospital, Hallym University

Cuts in insurance payments are bothering problems, especially in acute ischemic stroke treatment. Here we reviewed two cases of insurance problems in Dongtan Sacred Heart Hospital over past 5 years. One case was cuts in device – stent and aspiration catheter. The other was related with treatment prescription. There were no cuts insurance problems over past 3 years. It was possible through an avoidable black-label method. We recommend the elimination of limited quantity for thrombectomy devices.

FP1-4

뇌혈관조영술의 보험청구 및 삭감사례

조동영

이하여자대학교 서울병원

Introduction: 뇌혈관조영술의 수가는 현재 내경동맥, 외경동맥, 총경동맥, 추골동맥, 전뇌동맥의 5가지 분류로 청구되게 되어 있다. 청구 방법은 동시에 여러 개의 혈관조영술을 단일 장기에 시행하는 경우 200%까지 산정할 수 있으며, 산정 방법은 소정점수가 높은 혈관조영술을 100%, 두번째 혈관조영술붜는 50%를 산정한다. 3개의 혈관까지 밖에 청구할 수 없기 때문에 4개 이상의 혈관조영술을 시행하는 경우 전뇌동맥조영술 코드를 사용해야 하는데 전뇌동맥조영술의 수가는 현재 터무니없게 낮게 측정되어 있는 상황이다. 이번 사례에서는 뇌혈관조영술 이후 삭감된 사례를 중심으로 이에 대한 분석을 시행하고자 한다.

Method: 2019년 2월부터 2023년 12월까지 이대서울병원에서 시행한 뇌혈관조영술중 삭감 사례를 모아 분석 하였다.

Result: 총 12례의 삭감 사례를 찾을 수 있었다. 단일 장기에 200%까지만 청구가 가능하지만 250%이상 청구하 여 삭감된 사례가 있었고, 뇌혈관조영술 시행 후 같은날 코일색전술을 시행한 사례에서 코일색전술 후 시행한 뇌혈 관조영술이 삭감되는 사례가 있었다. 또한 3혈관 촬영을 시행하고 4혈관을 처방하여 삭감된 사례가 있었다. 또한 최대 금액을 청구하기 위해서는 각각의 혈관을 청구하여 200% 최대 산정을 하여야 하지만 수가가 터무니없이 낮 은 전뇌동맥조영술을 포함하여 청구가능 금액보다 낮은 금액을 청구한 사례들을 여럿 발견할 수 있었다.

Conclusion: 현재 전뇌동맥조영술의 수가가 터무니없이 낮게 측정되어 있어 전뇌동맥조영술을 포함한 처방은 되 도록 삼가는 것이 좋으며, 청구시 200%범위를 초과하지 않게 계산이 필요하다. 혈관조영술과 코일색전술을 같은 날 시행한 경우 코일색전술에 따른 혈관조영술 수가를 받을 수 없는데 이에 대한 개선이 필요해 보인다.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(급) ~ 22일(토)
광소: 제주에비치호텔

Symposium I

(Multidisplinary approach for cerebrovascular disease)

6월 21일(금) 14:40-15:40

좌장: 김범태 (순천향대)

권순찬 (울산대)

Ischemic stroke Imaging

이아름

순천향대 영상의학과

Anesthesia during treatment for cerebrovascular disease

박희평

서울대 마취통증의학과

ANESTHESIA DURING TREATMENT OF **CEREBROVASCULAR DISEASE**

HP Park

Department of Anesthesiology and Pain Medicine Seoul National University Hospital I have no COI related to this presentation



Contents

- Introduction
- General considerations
- Procedure-specific considerations
- Three cases
- Conclusions


Cerebrovascular diseases

- Type
 - Aneurysms
 - AVM/AVF
 - Occlusive vascular ds (carotid artery stenosis)
- Treatment
 - Endovascular














Ho MJ eNeurologicalSci. 2018

CLOSE COMMUNICATION BETWEEN ANESTHESIOLOGISTS AND **NEUROINTERVENTIONALISTS**









General Considerations for Anesthesia

- · Awake vs General Anesthesia
- - Continuous neuro-monitoring
 - Preservation of cerebral autoregulation
- · General Anesthesia
 - · Minimized motion artifact
 - Dynamic manipulation of blood pressure (BP) and ventilation parameters
 - Facilitate the rapid management of complications and transfer to the neurosurgical operating room

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

General Considerations for Anesthesia

• Pre-operative Assessment

- Standard pre-operative assessment
- The underlying pathology and associated multi-system effects
- Baseline neurological deficits
- Baseline BP
- Patient positioning
- · Risk of contrast-induced nephropathy

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

General Considerations for Anesthesia

Monitoring

- ECG, non-invasive BP, pulse oximetry, and capnography
- Invasive BP monitoring
- Large bore IV access
- · A urinary catheter
- Temperature monitoring and patient warming devices

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

General Considerations for Anesthesia

- Induction and Maintenance
 - Maintenance of cerebral perfusion pressure (CPP) and cerebral oxygenation
 - Extremes of BP should be avoided to attenuate the risk of bleeding and ischemia
 - High-dose opioids (e.g., remifentanil 2-4 mcg/kg) and
 - · NMBA for facilitating endotracheal intubation
 - · Both inhalational anesthesia in combination with remifentanil and total intravenous anesthesia (TIVA) may be used to maintain anesthesia

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

General Considerations for Anesthesia

- Induction and Maintenance
 - Continuous NMBA infusion
 - · Nitrous oxide is avoided due to the risk of expansion of micro-emboli
 - Peripheral infusion of an alpha-adrenergic receptor agonist (e.g., metaraminol or phenylephrine) to maintain hemodynamic stability and CPP
 - · Smooth emergence is essential to avoid spikes in ICP and to reduce risk of bleeding, particularly from groin vascular access sites
 - · A rapid wake up is also preferred to aid early neurological assessment.

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

General Considerations for Anesthesia

- Post-operative
 - · Appropriate BP control
 - Close attention should be paid to the development of neurological deficit or severe headache, indicating potential bleeding or vessel occlusion
 - · Post-operative nausea and vomiting
 - Euvolemia should be maintained as there can be a large osmotic diuresis due to the hyperosmolar contrast agents used
 - · Restrictions on the patient's mobility for some hours
 - · Strict monitoring of the vascular puncture site and distal perfusion

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M. Current Anesthesiology Reports 2021

General Considerations for Anesthesia

- · TIVA vs Inhalation anesthesia during interventional neuroradiology
- TIVA
 - Deep anesthesia
 - Prolonged extubation time
 - · More phenylephrine requirement
 - Smoother recovery

Kang F Anesth Pain Med 2019 Park HP Korean J Anesthesiol 2014

Procedure-Specific Considerations

- Endovascular Treatment of Cerebral Aneurysm
- Unruptured
 - · BP control during intubation
 - · High concentration of remifentanil
 - Esmolol
 - · Lidocaine spray

Procedure-Specific Considerations

- Endovascular Treatment of Cerebral Aneurysm
- Ruptured
 - Neurologic exam
 - GCS, neurological deficits, the amount of SAH
 - Multi-system sequelae
 - Sympathetic hyperactivity leading to myocardial ischemia and left ventricular impairment
 - · Neurogenic pulmonary edema
 - Sodium abnormalities
 - · BP control
 - IntubationCPP

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Procedure-Specific Considerations

- Endovascular Treatment of Vasospasm
 - Nimodipine
 - Induced hypertension
 - · Normo-/hypervolemia
 - · Optimization of cerebral oxygen supply

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Procedure-Specific Considerations

- Endovascular Thrombectomy
 - · Meticulous hemodynamic control
 - · Initial invasive arterial monitoring
 - Guidelines recommend maintaining systolic blood pressure between 140 and 180 mmHg
 - · Secondary insults should be avoided
 - Maintaining normoxia and CO₂ control, normothermia, and euglycemia

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Procedure-Specific Considerations

- Endovascular Treatment of Arteriovenous Malformations
 - · Normal perfusion pressure breakthrough
 - The arterial pressure should be kept at 20% below baseline following embolization
 - Steroids may be required to reduce post-procedure perinidal edema

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Procedure-Specific Considerations

- · Carotid Re-vascularization: Stenting
 - Stenting for symptomatic carotid stenosis is associated with a higher risk of peri-procedural stroke or death
 - Bradycardia or asystole may occur due to carotid body stimulation.
 - · Atropine and glycopyrrolate
 - External pacing
 - Post-procedure hypertension should be avoided to prevent cerebral hyper-perfusion syndrome

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Complications associated with endovascular neurosurgical procedures

- CNS complications
 - Aneurysmal perforation
 - Immediate management includes rapidly inducing hypotension, by either deepening anesthesia or using titrated doses of intravenous antihypertensives (e.g., labetalol), in order for endovascular control to be gained
 - · Heparin can be reversed with protamine
 - Platelet transfusion remains the primary treatment for reversal of anti-platelet agents, occasionally in combination with DDAVP
 - If the extravasated blood load is high, further interventions to control ICP may be required as a bridge to further CT imaging and definitive surgical intervention

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Complications associated with endovascular neurosurgical procedures

- CNS complications
 - Intracranial vessel injury, dissection, and perforation
 - Thromboembolism
 - Increasing the arterial pressure to 30–40% above baseline
 - Anti-platelet agents
 - Glue occlusion of distal vessels
 - Displacement of coil into parent vessel
 - Vasospasm
 - Hyperemia and swelling post-AVM embolization

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021

Complications associated with endovascular neurosurgical procedures

- Systemic complications
 - Contrast hypersensitivity reactions
 - · Contrast-induced acute kidney injury
 - Hemorrhage at the puncture site, groin hematoma, retroperitoneal hematoma, and arterial pseudo-

Lee CZ Curr Opin Anaesthesiol 2014, Earl M Current Anesthesiology Reports 2021


Case 1

- F/46
- Known Bechet ds
- Headache, nausea, Lt. weakness, dysarthria
- ER에서 검진중 obey-commend 안되면서 호흡이 나빠지고 seizure
- Intubation

- SAH, Fisher 3, HH grade 5
- Ruptured dorsal ICA blister like aneurysm
- EVD insertion




· Scheduled for endovascular coiling



- Preop VS
 - 120-150/56-64 80-96 15-23 36.5
- · Preop lab findings
 - Lactate 6.1
 - ABGA (FiO₂ 1.0)7.47-29-195-21.1






Intraoperative period

- Induction TIVA, phenylephrine cont. infusion FIO₂ 0.7에서 서서히 감소, PEEP 5 cmH₂O에서 서서히 증가 EVD setting 15 cmH₂O
- 20 min after induction

 - Desaturation (SpO₂ 91-95)
 Hypotension (ISBP 72 mmHg)
 Stress-induced cardiomyopathy and CPP
 Epinephrine and NE cont. infusion
- 60 min after induction
 ABGA (FiO₂ 0.45, PEEP 12 cmH₂O, SpO₂ 96)
 7.33-43-71-22.7
- The end of procedure
 VS 131/68-94-20-36.1
 FiO₂ 0.45, PEEP 12 cmH₂O, SpO₂ 99

Immediate postoperative period


- FiO₂ 0.7, PEEP 7 cmH₂O
- Precedex, remifentanil continuous infusion
- Epinephrine, NE, dobutamine continuous infusion
- · Echo finding
 - Compatible with stress-induced cardiomyopathy
- EVD setting 10 cmH₂O








- Rt proximal ICA occlusion
- Antiplatelet medication
- Caution to hypotension





POD 2

- Rt. retinal hemorrhage
- Lt. vitreous hemorrhage

POD 8-12

• #5 Vasospasm tx on both M1, M2, A2

POD 16

• Transfer to general ward

POD 36 and 43


Rt and Lt vitrectomies

POD 44


• Discharge without neurologic sequelae

Case 2


- F/64
- Incidentally found cerebral aneurysm



• latrogenic aneurysm rupture due to coil



· Contrast dye extravasation



- · Rapid additional coiling
- Nicardipine for BP drop SBP: 124 → 164 → 118 mmHg
- Protamine, mannitol



- Rt. sylvian fissure와 Rt. hemispheric sulci에 소량의 SAH Transfer to NICU without extubation
- Extubation in NICU
- · No neurologic deficit



Case 3


- F/52
- SAH ruptured BT aneurysm, coil embolization (17 days ago)
- Vasospasm tx.



Flow diversion and endovascular coiling for Lt. P2 pseudoaneurysm



- Nimodipine IA injection for vasospasm
- Communication about SBP elevation (110→ 130 mmHg) with phenylephrine continuous infusion



- Coiling and flow converter
- · Thrombosis within flow converter
- Tirofiban IA injection



Anesthetic emergence

- Extubation
- Lt. CN 3rd palsy
 - Ptosis
 - Pupil dilatation
 - Medial gaze difficulty with nystagmus
- Observation
- · Steroid therapy

Conclusions

- With respect to anesthetic aspects, immobilization should be necessary during neurointerventional procedures
- Both inhalational anesthesia in combination with remifentanil and total intravenous anesthesia (TIVA) can be used for anesthesia in patients undergoing neurointerventional procedures
- Close communication about the patient's status between anesthesiologists and neurointerventionalists is very important to improve clinical outcomes, especially in critically ill patients with multi-system sequelae and patients with intraprocedural complications



Rehabiliation for cerebrovascular disease

김기훈

고려대 재활의학과

ASCENT 2024

Rehabilitation for Cerebrovascular Disease

Ki-Hoon Kim, M.D., Ph.D. Korea University College of Medicine

Rehabilitation during acute phase

- ▶ Early mobilization
- DVT
- Deconditioning
- Gastroesophageal regurgitation
- Aspiration pneumonia
- Contracture formation
- Skin breakdownOrthostatic intolerance
- Positive psychological benifits

Rehabilitation during acute phase

- ▶ Method of early mobilization
 - Turning from side to side in bed
- Sitting up in bed
- Transferring to a wheelchair
- Standing and walking
- Self-care activities (feeding, grooming, dressing..)
- ▶ Should begin as soon as possible
 - Within 24 to 48 hours of admission if medically stable

Stroke Impairments and rehabilitation

- Motor impairment: Hemiplegia
- **▶** Spasticity
- → Cognitive deficit
- ▶ Aphasia
- ▶ Dysphagia

Motor Impairment

- ▶ What's affected by cerebrovascular disease
 - Strength
 - Power (speed with which force can be generated)
 - · Motor control and coordination
 - Muscle tone
 - Balance

Motor Impairment

- MRC (Medical Research Council's) 6-point scale
 - 0 to 5 (Zero to Normal)
 - 0: complete paralysis
 - · 3: ability to fully move the limb against gravity
 - 5: normal strength
 - · Clinical scale to assess strength
 - Useful in patients with lower motor neuronal lesion or myopathy
 - Problematic for assessing stroke patients
 - Failure to indicate the degree of motor control

Rehabilitation therapy for motor weakness

- > Approach to facilitate and enhance motor recovery
- Traditional approach: neurodevelopment technique by Bobath
- · Functionally oriented exercise training
- (e.g. transfer, early ambulation)
- · Recent approach: repetitive task-oriented practice
- > Optimal timing an dosing of motor rehabilitation remain uncertain

Rehabilitation therapy for motor weakness

- ▶ Constraint-induced movement therapy (CIMT)
- ▶ Locomotor training
- ▶ Robot-aided rehabilitation
- Noninvasive brain stimulation
- Neuromuscular electrical stimulation

Contraint-induced movement therapy

• "Learned nonuse" of the weak limb







- Cortical reorganization of motor system
- ▶ Condition
- · At least, partial wrist and finger extension
- · Proximal limb control, sufficient balance

Robot-aided rehabilitation

- Suitable for highly repetitive exercises
- ▶ Require skilled assistance (from a therapist) in setting the patient up
- Not been proven superior to conventional



Virtual reality and gaming system

- Encourage movement and provide feedback to users
- > Evidence of improved motor function
- Failed to demonstrate benefit of a particular gaming intervention compared to conventional upper limb motor activities
- Adjunct to conventional therapy



Neuromuscular electrical stimulation

- > = Functional electrical stimulation (FES)
- Lower limb devices: alternative to ankle-foot orthosis






Biofeedback using EMG signal

- ▶ Record surface EMG from muscle
- Auditory or visual feedback
- Result of trials: mixed



Transcranial magnetic stimulation (TMS)

- ▶ Strong but brief magnetic field
- Generate an electric current in the cortex
- Induce cortical excitability
- Possibility of inducing seizure
- Transient headaches



Spasticity

- ▶ Velocity-dependent increase in tonic stretch reflex
- Motor impairment, pain, disability following stroke
- Management
- Daily stretching
- Splint: hand, ankle
- Botulinum toxinOral antispastic agent
- · Intrathercal baclofen therapy



Cognition deficits


- ▶ Retaining of specific component skills
- ▶ Teaching compensation techniques
- Adaptation of environment
- Using visual aids, memory log, maps etc.





Aphasia

- → 1/4, acute phase -> 1/5, later phase
- > Slower, more prolonged time than motor recovery
- Most recovery: first 3-6 mon.
- Amount and pattern of recovery: initial severity & type
- prognosis: fluent aphasia > non-fluent aphasia
- ▶ Broca's (motor) aphasia
- ▶ Wernicke's (sensory) aphasia



Treatment of Aphasia

- ▶ Melodic intonation Tx (MIT) · noninjured functioning neural pathway (carry musical information)
- ▶ Encouraging verbalization
- ▶ Conversational coaching
- Oral reading



- exercise modalities
 oromotor speech muscle strengthening
 respiratory training
 retraining of articulatory patterns and gestures



- Neglect, denial of illness, loss of facial recognition
- Most of improvement: first 3 to 6 months after stroke
- ▶ Visual-spatial perceptual deficit
- Prism glasses
- Visuospatial cueing
- Computer-assisted training (Augmented Reality)
- Eye patch











Dysphagia

- ▶ Oral phase
- ▶ Pharyngeal phase
- ▶ Esophageal phase



- → Dysphagia: 1/3 1/2, all stroke survivors
- Aspiration, pneumonia, malnutrition, dehydration
- Malnutrition: 8-34% of patients

Rehabilitation of dysphagia

- ▶ Compensatory management
- · Changing posture and positioning for swallowing
- Learning new swallowing maneuvers (supraglottic swallowing)
- Changing food amount and texture





Rehabilitation for dysphagia

- ▶ Therapy strategies
- · Change swallow physiology
- Sensory stimulation, exercise program, swallow maneuvers
- Masako maneurver, Shaker exercise, Mendelsohn maneuver







Symposium I. Multidisplinary approach for cerebrovascular diseas			
Thanks for your attention!			

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(급) ~ 22일(토)
장소: 제주해비치호텔

Free Paper II

('My first case' from Young Gun)

6월 21일(금) 16:00-17:00

좌장: 백민우 (뉴고려병원)

이호국 (한림대)

FP2-1

Review of Early Cases: Giant Aneurysms Treated with Coil-assisted Flow Diverting Stents

Hyunjun Jo, Won-ki Yoon

Department of Neurosurgery, Korea University Guro Hospital

Objective: Until last year, the healthcare insurance system of Korea did not permit the use of coils in conjunction with flow diverting stents (FDS) for the treatment of giant aneurysms. However, utilizing coils alongside FDS can potentially mitigate the risk of unpredictable ruptures and facilitate rapid obliteration of the aneurysm. Recently, there has been a limited approval for the combined use of FDS and coils in Korea. As a young practitioner, I aim to present several cases where I have attempted this treatment approach.

Methods: The first case involved a 52-year-old female presenting with severe headache and diagnosed with a ruptured thrombosed giant aneurysm measuring 25mm in the right distal internal carotid artery (ICA). Treatment comprised deploying an FDS with five coils. Although post-procedural stenosis occurred, the patient recovered well, showing significant aneurysm obliteration on follow-up angiogram. The second case concerned a 63-year-old female incidentally found to have a left distal ICA aneurysm. Similar treatment was administered, with a 3-month CT angiogram indicating potential decreased distal middle cerebral artery (MCA) flow. A follow-up digital subtraction angiography (DSA) was planned at the 6-month mark due to the patient's asymptomatic status.

Result: The common challenges encountered during these treatments included the difficulty in assessing whether the FDS was adequately deployed when using coils alongside, compared to using FDS alone. Additionally, it was noted that alternative methods of follow-up, apart from DSA, could hinder rather than facilitate obtaining information. Seeking advice from senior physicians who practiced stent-assisted coil embolization for giant aneurysms before the advent of FDS could offer valuable insights. I submit an abstract to discuss this matter further.

Conclusion: While coil-assisted FDS offer advantages such as mitigating the risk of unexpected rupture, they pose challenges in follow-up procedures. To effectively utilize this treatment approach, in-depth consideration is required regarding the appropriate follow-up modality and timing.

FP2-2

Three cases of ruptured blood-blister like aneurysms treated with stent-assisted coil embolization using the LVIS EVO: a first-year experience

Min-Yong Kwon, Jae Hyun Kim, Chang-Hyun Kim, Chang-Young Lee

Department of Neurosurgery, Keimyung University Dongsan Hospital, Keimyung University School of Medicine

Objective: I encountered three ruptured blood blister-like aneurysms (BBAs) of the supraclinoid internal carotid artery in my first-year as an independent neurosurgeon, two of which were the first and second endovascular experiences of my life.

Methods: Patient 1 was a 39-year-old male with Hunt and Hess Scale (HHS) 2 and modified Fisher Scale (mFS) 4, identifying a tiny aneurysm of 1.3 mm in height and 3.3 mm in neck. Patient 2 was a 34-yearold male with HHS 2 and mFS 1, with a lesion of 2.4 mm in height and 4.9 mm in neck. Patient 3 was a 59-year-old female with HHS 3 and mFS 4, and a wide-neck aneurysm measuring 2.6 mm in height and 5.6 mm in neck. I treated ruptured supraclinoid BBAs with stent-assisted coil embolization (SACE) using the LVIS EVO, a wire-braided stent with high metal coverage, while patients 2 and 3 were treated with the semi-jailing technique of double microcatheter.

Result: Patient 1 had no intraprocedural complications, and Raymond Roy occlusion classification (RROC) was 1 immediately after procedure and 1 year later. Patient 2 suffered a distal occlusion involving the middle cerebral artery due to acute in-stent thrombosis, which fortunately resolved almost completely with intraarterial tirofiban injection. The immediate postprocedural RROC was 2. However, cerebral angiography after 6 months revealed severe in-stent stenosis at distal flared markers and major aneurysmal regrowth. Therefore, intracranial artery stenting with Wingspan and additional SACE overlapping the LVIS EVO was performed, and cerebral angiography after 10 months confirmed that the improvement was well maintained. Patient 3 also had an immediate RROC of 1, however, cerebral angiography 11 days later identified recanalization of RROC 2 and overlapped stenting was performed. The lesion was completely obliterated on angiography after 4 months. Based on the modified Rankin scale, patients 1 and 2 are scored as 0 and patient 3 is scored as 1 due to mild cognitive impairment. All are currently being followed up on an outpatient clinic.

Conclusion: SACE with LVIS EVO for ruptured supraclinoid BBAs may be a beneficial treatment option. However, given the rapid morphological changes and frequent recurrence of BBAs, it is advisable to consider overlapped stenting in advance.

FP2-3

Endovascular Treatment (EVT) for Wake-up Acute Ischemic Stroke (AIS): My first, agonizing experience in my life

Gwang-Tae Park, Young-Jin Jung

Department of Neurosurgery, Yeungnam University Medical Center

Objective: When acute ischemic stroke (AIS) with large artery occlusion (internal carotid artery (ICA) and middle cerebral artery (MCA)) occurs, endovascular treatment (EVT) should be performed after checking several points such as onset time for symptom development, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score and Alberta Stroke Program Early CT score (ASPECTS). In the case of wake-up AIS with borderline ASPECTS, however, we need careful decision how to treat. I would like to report my first EVT case performed on a patient with wake-up stroke.

Methods: 63 year-old man was admitted at ER with mental deterioration and motor weakness. Time last known to be well (TLKW) was within 24 hours with unknown clear onset and initial NIHSS score was very high at 20. On brain CT angiogram, right ophthalmic ICA occlusion was checked but ASPECT score was very low at 3. Nevertheless, considering relatively young age, normal preoperative modified Rankin Score (mRS), we proceeded to do EVT immediately. After 4times trial of stent retriever thrombectomy (SRT), recanalization was checked completely. But severe brain swelling and midline shifting happened, so decompressive craniectomy was done. Unfortunately, patient died after POD#13.

Result: I concerned whether to do thrombectomy or not because of borderline ASPECT score, poor patient's neurology and unclear onset time. Someone told that we should not carry on procedure because of predictable reperfusion injury.

Conclusion: But, as long as it doesn't go against treatment indication, I think we should not give up even if poor prognosis is expected.

FP2-4

Facing the First Mountain: A Young cerebrovascular surgeon's Case report of Aneurysm treatment

황인현

이정부을지대병원

Objective: The first case of aneurysm is big mountain for all cerebrovascular neurosurgeon. The path may not be visible in the mountains, but it's a mountain that must be crossed. In this case, we described the course of overcoming tragedy of first case of young cerebrovascular neurosurgeon.

Methods: This report is case review.

Result: The sixty years old female patients was visited the emergency room for headache. Initial Hunt-Hess grade was 3 and Fisher grade was 4. After cerebral angiography, elipsoid posterior communicating artery aneurysm was cofirmed. The aneurysm was treated with coil embolization. After coil packing, right proximal M2 obstruction was identified in ICA angiography. Aspiration thrombectomy was attempted initially, but the aspiration catheter could not pass through the carotid siphon. After stent deployment, passage through the carotid siphon was facilitated via stent anchoring, enabling successful thrombus removal with a stent retriever thrombectomy.

Conclusion: The first case is always accompanied by fear for young cerebrovascular neurosurgeons. However, with perseverance, it's a mountain that can be climbed step by step.

FP2-5

Flow Diverter as a Rescue Treatment for Ruptured Blood Blister-Like Aneurysm in a Patient with Multiple Medical Issues

이주환, 김성태, 이진, 정해웅, 정영균

인제대학교 부산백병원

Objective: Treatment of ruptured blood blister-like aneurysms(BBA) is challenging. This study aims to present a case where a flow diverter was used as a rescue treatment following multiple stent-assisted coiling in a patient with multiple medical issues, including COVID-19 and colon cancer bleeding.

Methods: A 60-year-old male presented with stupor and left-side weakness. CT scan revealed a thick SAH (mFG 4), and the patient tested positive for COVID-19. Cerebral angiography detected a blood blister-like aneurysm (BBA) on the right ICA dorsal wall. Initial treatment involved stent-assisted coiling using two Neuroform ATLAS stents. Postoperatively, the patient was placed in isolation due to COVID-19. On POD 4, massive hematochezia occurred, and only transfusions were possible. Minor recurrence of the aneurysm was detected one week after isolation release, leading to a reduction in antiplatelet therapy. A ventriculoperitoneal shunt was performed at three weeks. Persistent hematochezia led to the diagnosis of colon cancer bleeding.

Result: Four-week angiography revealed a major aneurysm recurrence. Colon cancer surgery was prioritized, followed by a flow diverter (Surpass Evolve 3.25mmX20mm) deployment over the existing stents two weeks after laparoscopic resection. Three-month follow-up angiography showed aneurysm growth, prompting a reduction to single antiplatelet therapy. Serial HRMRI indicated stability of the BBA. At 18 months, angiography confirmed aneurysm resolution, though A1 flow was significantly reduced. After extensive chemotherapy and rehabilitation, the patient achieved independent living (mRS 2).

Conclusion: The flow diverter served as an effective rescue treatment for a ruptured blood blister-like aneurysm. In a patient with multiple medical issues, including COVID-19 and colon cancer, this case highlights the necessity of a multidisciplinary approach in managing such complex conditions.

FP2-6

Overcoming severe aortic tortuosity in endovascular treatment of intracranial aneurysm

Se Yun Kim, Jong Min Lee, Soon Chan Kwon

Department of Neurosurgery, Ulsan University Hospital, University of Ulsan College of Medicine

Objective: Effective access to supraaortic vessels and intracranial arteries is critical for neuroendovascular procedures. Navigating the aortic arch can be particularly challenging when anatomical complexity is present.

Methods: We share experiences from two cases - a ruptured aneurysm in a 77-year-old female and an unruptured aneurysm in a 76-year-old female - both complicated by severe aortic tortuosity. Various guide wires and catheters were used, and saline flushes were employed to gradually navigate the catheter. Specifically, 035 - buddy-wire assisted distal navigation technique was instrumental in overcoming severe aortic tortuosity.

Result: After persistent efforts, these attempts successfully opened the path to the desired target vessel.

Conclusion: These cases highlight unexpected challenges in the proximal vascular region and demonstrate effective strategies to manage these difficulties.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(급) ~ 22일(토)
광소: 제주해비치호텔

Free Paper III. Agony Session

(Sharing painful memory for improvement)

6월 21일(금) 17:00-18:00

좌장: 권오기 (서울대)

장철훈 (영남대)

FP3-1

A WEB Embolization of a Large Anterior Communicating Artery Aneurysm with a Tortuous Anatomy: An Inadvertent **Event and Technical Nuance**

Dong-Sub Kim, Byung-Rae Cho, Young Hoon Choi, Dong-Kyu Jang^s

Department of Neurosurgery, Incheon St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea

Objective: This study aimed to report an inadvertent event of a VIA27 microcatheter destruction stuck with a WEB device during retrieval of the deployed WEB device because of size mismatching in a larger anterior communicating artery aneurysm with a very tortuous anatomy.

Methods: A 76-year-old female patient presenting with a large anterior communicating (ACOM) aneurysm with multiple intracranial atherosclerotic changes and tortuous anatomy. A right-side dominancy and aneurysm size were noted as 8.74x6.79x10.18mm (DNH). WEB embolization was planned due to a wide neck branch aneurysm.

Result: Under general anesthesia, a right femoral puncture was done and a 7F sheath was positioned up to the right CCA over the Headhunter catheter. A Sofia 5Fx115cm guiding catheter was positioned up to Rt C7 ICA, and 2D and 3D DSA were performed during left carotid compression. A working angle was set up. Aneurysm volume was calculated with AngioCalc software (www.angiocalc.com) as 416.94mm³. According to the WEB SL volume chart, the first choice was selected with a WEB SL 9x6mm (381.7 mm³), not a WEB SL 9x7mm (445.3mm³). A VIA27 microcatheter was positioned up to right A2 and the tension of triaxial system was released and the VIA27 catheter was inserted into the aneurysm sac. The selected WEB SL 9x6mm device was inserted into the microcatheter and tried to be inserted into the aneurysm with remarkable resistance due to tortuous anatomy. However, we identified the WEB SL 9x6mm device was proved to be under-fitted with the aneurysm. We tried to retrieve the WEB SL 9x6mm device but failed to recapture it due to being stuck with the VIA27 microcatheter. Therefore, we retrieved the VIA27 and WEB SL 9x6mm, altogether. During the retrieval procedure of the VIA27 and WEB SL 9x6mm, the Sofia 5F guiding catheter was advanced up to Rt A1 due to the principle of action and reaction. Another VIA27 microcatheter was inserted into the aneurysm sac and WEB SL 9x7mm was deployed into the aneurysm successfully. She was discharged two days later without any complications. At the 3-month follow-up, neither recurrence nor event were noted.

Conclusion: Microcatheter destruction might have been better considered as an inadvertent complication during the WEB device deployment for a large volume ACOM aneurysm with a very tortuous anatomy. In such a situation, a guiding catheter positioning up to A1 could be a technical tip for successful deployment.

FP3-2

Flow diverter stent-assisted coil embolization of recurrent basilar artery aneurysm

성승언

동래봉생병원 신경외과

Objective: A 55-year-old female patient who had undergone double stent-assisted ruptured basilar artery aneurysmal coil embolization 15 years ago presented to the our hospital with dizziness. She had underlying diseases such as autoimmune liver disease and hypertesion. Brain MRI/A and cerebral angiography showed recurrent mid-distal BA aneurysm. We performed Flow diverter stenting with coil embolization. (Semi-jailing)

Methods: Immediate post operative patient's neurologic status and radiologic findings were normal. However, despite appropriate antiplatelet agents and steroid treatments, brainstem infarction occurred four times over 10 weeks. The patient became unable to walk due to quadriplegia. After careful consideration of the patient's data, several tests performed showed significantly low serological cortisol levels.

Result: The above results were judged to be iatrogenic adrenal insufficiency caused by steroids administered over a long period of time to treat autoimmune liver disease. The inflammatory reaction that occurred around the stent and the occlusion of the perforators were determined to be caused by a lack of steroids.

Conclusion: After hydrocortisone administration, the patient was able to walk independently.

FP3-3

Delayed collapse of flow diverter after treatment of cervicopetrous ICA giant aneurysm: another concern for flow diversion in giant aneurysms

Seung Pil Ban, O-Ki Kwon, Young Deok Kim, Hwan Seok Shim

Department of Neurosurgery, Seoul National University Bundang Hospital

Objective: Delayed morphological change of flow diverter stents (FDS) can bee seen in the form of deformation, fish-mouthing, foreshortening, migration and in-stent stenosis. These changes can be seen secondary to various device- and vasculature-related factors such as improper sizing of the device, twisting of the device in tortuous anatomy, insufficient proximal lading zone, and insufficient chronic resistive force of stent.

Methods: A 32-year-old-male presented with severe headache on the left side. The initial brain MRA and TFCA showed giant aneurysm in the left distal cervical and petrous ICA. We performed deployment of the flow diverter (Surpass Evolve, 5.0 X 40 mm). To prevent migration of the flow diverter and anchor the proximal end, a 5.5 X 30 mm LVIS Blue stent was deployed from the proximal one third section of the flow diverter to distal cervical ICA. There was no morphological change of the flow diverter and neurological change.

Result: On 1-year follow-up CT angiography, delayed collapse of the flow diverter was detected at the midsection of the flow diverter. We performed follow-up TFCA and giant residual sac filling with collapsed midsection was identified. We tried to dilated collapsed section using a Scepter balloon, but collapsed part was not dilated. We deployed additional flow diverter (Surpass Evolve, 5.0 x 40 mm) and performed post-balloon angioplasty using Scepter balloon. The 10-month follow angiogram revealed no change of collapsed flow diverter lumen with decreased aneurysmal sac filing.

Conclusion: Delayed collapse of flow diverter should be taken into consideration when planning flow diversion in giant aneurysms.

FP3-4

Should Patients with Acute Minor Ischemic Stroke With Isolated Internal Carotid Artery Occlusion Be Thrombolysed?

Seung Yoon Song, Sol Hooy Oh, Dong Hoon Lee, Jae Hoon Sung

Department of Neurosurgery, St. Vincent's Hospital, The Catholic University of Korea

Objective: The endovascular treatment (EVT) in patients with acute symptomatic isolated occlusion of the internal carotid artery (ICA-I occlusion) without involvement of the middle and anterior cerebral arteries is still controversial. We report a case of a patient with acute ICA-I occlusion who underwent EVT using multiple techniques but presented with neurologic deterioration after successful reperfusion.

Methods: An 80-year-old female patient presented to our institution's emergency department with a complaint of mental alteration. It had been approximately 30 hours since her last normal time and she was presenting with mild drowsiness, disorientation, and right arm weakness (NIHSS 3). Brain CT angiography & perfusion performed on admission revealed left ICA occlusion with MCA territory perfusion delay. Right ICA showed collateral flow to the left hemisphere through the anterior communicating artery and perfusion mismatching findings were also identified, so it was decided to try recanalization through EVT.

Result: Initial left ICA angiography confirmed a cavernous ICA occlusion and right ICA angiography showed a retrograde collateral through the anterior communicating artery. Recanalization through a combined technique using a retriever stent and an aspiration catheter was attempted, but delayed occlusion due to severe arteriosclerosis continued to occur, and ICA recanalization was successfully performed through balloon angioplasty and stent insertion. However, middle cerebral artery (MCA) occlusion due to distal emboli was newly observed on angiography after ICA recanalization. During thrombectomy for the MCA occlusion, the previously deployed stent was removed but finally, MCA was successfully recanalized using a combined technique. However, after the procedure, the patient neurologically worsened from before the procedure, with a stuporous mentality, global aphasia, and right hemiparesis (NIHSS 18). Since then, the patient has been bedridden with an mRS of 4 despite continued rehabilitation.

Conclusion: Although many recent studies have reported the benefit of intervention for acute ICA-I occlusion, the risk of embolization must nevertheless still be considered, so careful patient selection is therefore important.

FP3-5

Fetal Bleeds after Flow Diversion for Large-Sized Aneurysms

GT Park, JH Kim, CH Chang, YJ Jung

Department of Neurosurgery, Yeungnam University Medical Center

Objective: To review the authors' experience with fetal bleeds after flow diversion (FD) treatment of large-sized aneurysms.

Methods: The authors retrospectively reviewed their FD cases performed between 2016 and 2024. Among 40 FD cases, they identified 2 cases with hemorrhagic complications, including 2 instances of fetal bleeds shortly after FD treatment

Result: Case 1: A 51-year-old female patient with a large dICA aneurysm (N/H/W 3.95/16.20/18.95 mm) underwent coil embolization followed by a single Pipeline embolization device. The patient died on postoperative day 1 due to fetal bleeds. Case 2: An 81-year-old female patient with a large BA (BV junction) aneurysm (N/H/W 8.72/13.69/14.43 mm) underwent Surpass flow diverter placement from Lt VA to BA and Rt VA trapping. The patient died on postoperative day 5 due to hemorrhage. In both cases, there was persistent high-velocity jet flow within the aneurysm sac after FD, which likely led to the acute fetal bleeds.

Conclusion: To mitigate the risk of fetal bleeds after FD treatment of large/giant aneurysms, the authors suggest using adequate coil embolization within the aneurysm sac and/or deploying additional FD devices in the parent artery to reduce the jet flow.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(금) ~ 22일(토)
광소: 제주해비치호텔

대한뇌혈관내치료의학회 연구비 지원사업 공모 발표

6월 22일(토) 10:00-10:30

좌장: 김태곤 (차의과학대)

황교준 (분당제생병원)

대한뇌혈관내치료의학회 연구비 신청서

연구 과제명	(국문) 표면 처리 혈류전환 스텐트의 임상적 유효성 — 다기관 후향 연구			
연구기간	(영문) Clinical Effectiveness o Multicenter Retrospective Stu 연구과제 선정 후 1년	of Flow Diverting Stent with Surface Modification - udy		
	(성명) (국문) 강 현 승 (영문) Kang, Hyun- Seung			
	(소속) 서울대학교 의과대학 신	신경외과학 교실		
연구 책임자	(직위) 교수	(전문과목) 신경외과		
	(E-mail) kanghs@snuh.org			
	(전화) 02-2072-2350 (휴대전화) 010-6229-9365			
연구비 종류	□ 기초, ■ 임상 (예산안) 총 2000 만원			
IRB 심의	□ 승 인, ▮	■ 제출 – 심의중, □ 해당 없음		
본인	(등)은 대한뇌혈관내치료의학회	연구비를 소정의 서류를 갖추어 신청합니다.		
	2024 년	4 월 30 일		
연구*	백임자 직위: 교 수	성명: <u>강 현 승</u> (인)		
공동(연구자 직위: <u>교 수</u>	성명: <u>김 강 민</u> (인)		
	직위: <u>교 수</u>	성명: <u>반 승 필</u> (인)		
	직위: <u>교 수</u>	성명: 이 덕 희 (인)		
	직위: <u>교 수</u>	성명: <u>백 승 국</u> (인)		
	직위: <u>교 수</u>	성명: <u>박 정 현</u> (인)		

대한뇌혈관내치료의학회 귀중

연구계획서

1. 연구의 배경 및 필요성

1-1) 연구개발의 배경

뇌동맥류(cerebral aneurysm)는 뇌혈관이 풍선처럼 부풀어 오르는 병으로 파열시 뇌지주막하출혈 (subarachnoid hemorrhage)을 일으키는 치명적인 질환이다. 기존에는 개두술을 통한 클립 결찰외 다른 치 료 방법이 없었으나 1990 년대에 분리형 코일 (detachable coil)이 개발되고 안전성 및 유효성이 입증되면 서 현재는 코일 색전술이 첫 번째 치료 방법으로서 많이 선택되고 있다. 또한 2002년 ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial) 결과 발표 이후 [1] 현재 뇌동맥류의 치료의 중심에는 혈관내 치료가 자리잡 고 있다. 지난 20년간 지속적인 코일 색전술과 연관된 뇌혈관내 시술 기구가 발전하면서 치료 성적이 좋아지고 많은 난치성 뇌동맥류를 안전하게 치료하게 되었다. [2]

현재 뇌동맥류의 혈관 내 치료의 가장 많은 부분을 차지하고 있는 것은 코일색 전술이다. 코일 색전술의 치료의 유효성과 안전성은 앞에서 언급한 것과 연구결과로서 확보되어 있으나 치료 후 시간이 지남에 따라 재발의 위 험성이 있다는 단점이 있다. 특히 크기가 큰 뇌동맥류의 경우 코일 색전술 이후 재발의 위험성이 높은 것으로 알려져 있다. [3]

이러한 재발의 위험성을 비롯한 코일 색전술의 단점을 극복하고자 여러가지 치료 방법 및 기구들이 고안되 어 왔는데 혈류전환 스텐트 (Flow-diverting stent)가 그 대안 중 하나로 제시되고 있다. 2010년대에 소개 된 혈류전환 스텐트(flow diverting stent)는 기존의 코일색전술로 치료가 어려웠던 난치성 동맥류를 모동맥 (parent artery) 안에 스텐트를 설치함으로써 안전하게 치료할 수 있는 획기적인 방법이었다. [4] 혈류전환 스 텐트의 사용은 다른 나라에서의 경우 뇌혈관 동맥류의 치료로서 현재 활발하게 사용되고 있으나 우리나라의 경 우 보험기준에 따라 일부 환자에서 제한된 적응증으로 뇌동맥류 치료에 적용되고 있다. [5]

1-2) 연구개발의 필요성

혈류전환 스텐트를 사용한 치료의 장점은 위에 언급한 것과 같이 기존 코일 색전술로는 재발 가능성이 높은 환 자에서 장기적으로 안정적인 동맥류 폐색을 이루어 낼 수 있다는 것이다. 하지만 혈류전환 스텐트는 뇌동맥류 치료에 사용함에 있어 단점들 또한 가지고 있다. 이 기구를 안정적으로 사용함에 있어 기술적인 경험이 필요하 다는 점과 료 과정에 따르는 합병증의 발생이 기존의 코일 색전술보다 높다는 점, 항혈소판제의 장기적인 복용 이 필요하다는 점 등이 그것이다. [5]

이러한 단점을 극복하기 위해 여러 노력이 이루어졌는데 그 중 하나가 혈류전환 스텐트를 구성하는 metal의 구 성을 바꾸는 것과 스텐트 내면에 항혈소판 효과를 지닌 약제를 코팅하는 것이다.

이러한 노력들로 새롭게 개발된 혈류전환 스텐트가 기존의 혈류전환 스텐트들에 비해 실제 환자 치료에 적용됨 에 있어 치료의 효과가 있는지에 대한 유효성과 합병증 발생의 위험성은 낮은지에 대한 즉 안전성에 대한 평가 는 필요하다. 본 연구는 우리나라에서 혈류전환 스텐트를 많이 사용하는 다기관에서의 임상적 결과를 통해 기 존의 단점을 개선한 혈류전환 스텐트의 치료의 유효성과 안정성을 검증하고 향후 난치성 동맥류 혈관 내 치료 에 대한 대안을 제시하고자 한다.

2. 연구의 목표 및 내용

개선된 혈류전환 스텐트 중 국내에 가장 먼저 도입된 Pipeline Shield (Medtronic, Irvine, CA, USA) 로 다 기관 후향적 연구를 진행하려고 한다. 이는 국내에서 가장 먼저 치료에 도입된 혈류전환 스텐트로서 단기간 (short-term), 장기간 (long-term) 치료의 유효성 및 안정성을 검증하는 것이 가능하며 증례의 수도 다른 혈 류전환 스텐트에 비해 많아 높은 검증력을 기대할 수 있을 것으로 생각된다.

다기관 registry를 이용하여 안전성, 유효성을 평가하고자 하며 최종 목표는 다음과 같다.

- 혈류전화 스텐트의 안전성:

- A. 치료 후 30일 이내 뇌출혈, 뇌경색, 기타 합병증 발생율, 사망률 평가
- B. 치료 후 30일 이후 뇌출혈, 뇌경색, 기타 합병증 발생율, 사망률 평가
- C. 장기 주적 관찰에서 뇌출혈, 뇌경색, 기타 합병증 발생율, 사망률 평가

- 혈류전환 스텐트의 유효성:

A. 치료 후 6개월 및 그 이후 최근의 추적 검사: 동맥류 폐색의 정도 (영상학적 평가), 혈관협착 및 혈관폐색의 빈도

3. 연구의 추진전략 및 방법

A. 연구 대상 선정 기준 및 제외 기준

- 선정기준: 2023년 7월까지 상기 기술된 참여기관에서 뇌동맥류에 대하여 Pipeline Shield (Medtronic. Irvine, CA, USA) 및 Pipeline Shield 도입 이전 제품군 (Pipeline 및 Pipeline Flex)으로 치료받은 환자
- 제외기준: 해당사항 없음
- 참여기관 (공동연구자): 서울대병원 (김강민, 조영대, 유동현), 분당서울대병원 (반승필), 서울아산병원 (이덕희, 박중철, 송윤선), 양산부산대병원 (백승국, 노지윤), 동탄성심병원 (박정현)
- 연구대상자수: 301 case (서울대병원: 77. 분당서울대병원: 37. 서울이산병원: 101. 양산부산대병원: 46. 동탄성심병원: 40)

B. 구체적인 연구 방법

2023년 7월까지 상기 기술된 참여기관에서 뇌동맥류에 대하여 Pipeline Shield를 사용하여 치료받은 환자를 비 교군으로 설정한다. 이에 대한 대조군으로 Pipeline Shield 도입 이전 제품군 (Pipeline 및 Pipeline Flex)으로 치료받은 환자군을 설정한다. 각각 군에서의 임상정보, 영상 소견 등을 후향적으로 분석하여 다음을 평가한다.

1) 안전성 평가

- a) 치료 후 30일 이내 뇌출혈, 뇌경색, 기타 합병증 발생율, 사망률 평가
- b) 치료 후 30일 이후 뇌출혈, 뇌경색, 기타 합병증 발생율, 사망률 평가
- c) 장기 주적 관찰에서 뇌출혈, 뇌경색, 기타 합병증 발생율, 사망률 평가

2) 유효성 평가

- a) 동맥류 폐색의 정도 (영상학적 평가) 방법: 시술 후 6개월 및 최근 MRA or conventional angiography
- b) 혈류전환 스텐트가 삽입된 모동맥의 협착 및 폐색의 빈도 (영상학적 평가) 방법: 시술 후 6개월 및 최근 MRA or conventional angiography - Imaging data 수집 후 독립적인 평가자 (radiologist)에게 의뢰
- c) 추적관찰 기간 중 재치료율

C. 수집할 데이터 항목

- 환자의 기본 임상 정보: 나이, 성별, 시술 전 증상, 위험인자(고혈압, 당뇨, 고지 혈증, 흡연, 뇌졸중 병력, 뇌 동맥류 가족력). 기타 병력 (예를 들어 암. 심장 질 환)
- 동맥류의 특성: 파열 여부, 위치, 크기
- 치료 관련 정보: 사용한 혈류전환 스텐트의 종류와 크기, 다른 사용 기구 (예를 들어 스텐트, 풍선카테터, 코 일 등), 치료 중 합병증
- 환자의 임상 경과: 신경학적 증상, 뇌경색/뇌출혈 발생여부, 항혈소판제제 사용
- 혈류전환 스텐트치료 영상 (conventional angiography, fluoroscopic image)
- 시술 후 추적 영상 (MRA, conventional angiography or fluoroscopic image)

4. 연구 결과의 활용방안 및 기대성과

- 본 연구를 통해 현재 연구의 대상인 surface modified 혈류전환 스텐트의 안전성 및 실효성을 평가할 수 있 음 혈류전환 스텐트를 이용해 치료를 받는 환자에게 정확한 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대됨.
- 이후 도입되고 있는 다른 종류의 surface modified 혈류전환 스텐트의 연구에도 비교 데이터의 제공을 통해 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 사료됨.

5. 기단사항

- 본 다기관연구에 총 5개 기관이 참여 의사를 밝힌 상태로 분석대상의 숫자는 대조군까지 합하여 301례 정도 로 추정됨.
- 연구 과제 선정 후 다기관 IRB 진행 예정임.

6. 참고문헌

- (1) Molyneux A, Kerr R, Stratton I, et al. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. Lancet 2002;360:1267-1274
- (2) Diringer MN: To clip or to coil acutely ruptured intracranial aneurysms: update on the debate. Curr Opin Crit Care 11:121-125, 2005
- (3) Choi HH, Lee SH, Yeon EK, Yoo DH, Cho YD, Cho WS, Kim JE, Son YJ, Han MH, Kang HS. Determination of Aneurysm Volume Critical for Stability After Coil Embolization: A Retrospective Study of 3530 Aneurysms. World Neurosurg. 2019 Dec;132:e766-e774. doi: 10.1016/j.wneu.2019.08.020. Epub 2019 Aug 12. PMID: 31415892
- (4) Cappuzzo JM, Monteiro A, Taylor MN, Wagas M, Baig AA, Almayman F, et al: First U.S. Experience Using the Pipeline Flex Embolization Device with Shield Technology for Treatment of Intracranial Aneurysms. World Neurosurg 159:e184-e191, 2022
- (5) Kim T, Kwon OK, Lee H, Cho MJ, Jeong HJ, Ban SP. Nationwide Mortality Data after Flow-Diverting Stent Implantation in Korea. J Korean Neurosurg Soc. 2018 Mar;61(2):219-223. doi: 10.3340/ jkns.2017.0218. Epub 2018 Feb 28.PMID: 29526065

연구 책임자 서약서

연구과제명: 표면 처리 혈류전환 스텐트의 임상적 유효성 - 다기관 후향 연구

본인은 대한뇌혈관내치료의학회 연구비 지급 규정 제 7 조에서 정한 연구비 수혜자의 의무를 이행하지 못할 경우 제재 조치 (연구비 환수 조치)에 따를 것을 서약합니다.

2024 년 4월 30일

沙克吉 연구 책임자 강 현 승 (인)

대한뇌혈관내치료의학회 귀중

총괄 실행예산 내역서

구분 비목	세 부 내 역	금액 (원)	비율
1. 연구원 인건비	책임 및 공동연구자 연구원 인건비	8,000,000	40
2. 여비	국내 출장 여비 1회 4인 평균 250,000*예상횟수1회	1,000,000	5
	참고문헌 구입비		
3. 기술정보활동비	회의 개최비용 1회 * 예상횟수 회		
	원고료, 번역료, 통역료	500,000	2.5
	전문가 자문료 1회 500,000 * 예상횟수 8회	4,000,000	20
4. 연구기자재구입비	연구기자재 구입비		
5. 시설비 및 기자재	회의장 임차료		
임차료	1회 * 예상횟수 회 장비 사용료		
6. 재료 및 전산처리비	재료비 - 전산처리비	2,125,000	10.625
	인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비		
7. 수용비 및 수수료	사무용품비		
	간 접 비 (서울대)	4,375,000	21.875
총 액			100%

- * 재료비 세부내역은 별도의 서식(첨부)을 사용하십시오.
- * 연구의 성격에 따라 필요한 비목에 대해서만 계상하십시오.

대한뇌혈관내치료의학회 연구비 신청서

연구 과제명	(국문) 한국형 지주막하출혈 동맥류 치료 연구				
	(영문) Korean Subarachnoid A	Aneurysm Trial, KSAT			
연구기간	연구과제 선정 후 2년				
	(성명) (국문) 권순찬	(영문) KWON, Soon Chan			
 연구 책임자 1	(소속) 울산대학교병원				
연구 역심사 1	(직위) 교수	(전문과목) 신경외과			
	(E-mail) nskwon.sc@gmail.com				
	(전화)	(휴대전화) 01032587312			
	(성명) 오재상	(영문) Jae Sang Oh			
연구책임자 2	(소속) 가톨릭대학교 의정부성도	병원			
	(직위)	(전문과목) 신경외과			
	(E-mail) metatron1324@naver.com				
	(전화) 01029183903	(휴대전화) 01029183903			
연구비 종류	□ 기초, V 임상	(예산안) 2,000 만원			
IRB 심의	□ 승 인, □ 제출 - 심의중, V 해당 없음				

본인 (등)은 대한뇌혈관내치료의학회 연구비를 소정의 서류를 갖추어 신청합니다.

2024 년 03 월 14 일

연구책임자 1 직위 : 교수 성명 : 권순찬

연구책임자 2직위 : 부교수 성명 : 오재상

공동 연구자 1 직위 : 성명 : 이종민

대한뇌혈관내치료의학회 귀중

연구계획서

연구의 배경 및 필요성

1. 연구 개발 배경

동맥류 파열에 의한 지주막하 출혈은 최근 고령화와 영상의학적 검진방법의 발달로 유병률이 상승하고 있는 질 환으로, 결국은 파열되어 지주막하출혈로 이행됨으로써 높은 사회적, 경제적 비용을 야기하는 질환임. (표 1)

질병당	병	구분	2017	2018	2019	2020	2021
	지주막하	환자수 (명)	34,702	37,177	38,071	38,248	38,577
160.1~160.9	출혈	요양급여 비용 총액 (천원)	195,305,202	222,924,913	247,279,419	259,751,988	266,714,134


표1. 지주막하 출혈 환자 국민건강보험 청구현황 (2017 ~ 2021)

* 출처: 건강보험심사평가원



- 뇌동맥류 발생 원인은 현재까지 명확하게 밝혀지지 않았으나 파열에 의해 뇌출혈이 발생(지주막하 출혈)
- 출혈 순간 극심한 두통이 발생하고 3분의 1의 환자는 그 자리에서 즉사, 3분의 1은 병원 이송 중 또는 병원에 서 사망. 나머지 환자만이 치료 가능함.
- 파열된 뇌동맥류를 치료하는 방법으로는 개두술을 통한 뇌동맥류 결찰술과 혈관내수술을 통한 뇌동맥류 코 일 색전술 두가지 치료기술이 있음.





출처: Bayhealth Medical Center

2. 국내 및 국외연구 현황

동맥류 파열에 의한 급성 뇌 지주막하 출혈의 치료에는 개두술을 통한 뇌동맥류 결찰술과 혈관내수술을 통한 코일색전술의 두가지 방법이 있다. 이 두가지 치료법 중 무엇을 선택하느냐는 각 센터의 상황마다, 치료자의 선 호도마다 다를 수 있겠으나, 급성 뇌 지주막하출혈의 치료에 대한 국제 다기관, 전향적, 무작위 연구로 진행된 2002년의 연구 (International Subarachnoid Aneurysm Trial, 이하 ISAT) 에서 1년째 기능적 결과가 혈관 내치료를 통한 코일 색전술에서 통계적으로 유의미하게 우수하였으며, 재출혈의 빈도는 코일 색전술에서 더 높 았던 것으로 결론 내렸다.

하지만 ISAT는 enroll되었던 환자중 대다수가 무작위 과정에서 제외되어 환자군 선택에 있어서 선택 비틀림이 개입했을 가능성을 염두에 두어야 한다. 이는 실제 의료환경에서 사실 큰 대안은 없는 부분이며, ISAT 시행 당 시의 기술력으로는 경부가 넓은 동맥류나 낭포성 동맥류가 아닌 형태의 동맥류 등은 혈관내수술로 치료하기 힘 들었다는 점을 고려해야한다. 또 한가지 ISAT가 받는 비판은 수술적 치료가 지연된 환자들이 많았다는 것이며 그것이 결과에 영향을 미쳤다는 것이다. 이외에도 ISAT의 한계점에 의해 추가적으로 입증되어야 할 부분들이 존재한다. 첫째로는 수술이 더 적합하여서 분석에서 제외되는 예를들면 중대뇌동맥 분지부 동맥류 같은 경우가 있으며, 혈관내치료가 더 위험할 수 있는 동맥류 예를 들면 크기가 매우 작은 동맥류이거나 스텐트의 사용이 강 제되는 경부가 넓은 동맥류 등이 있다. 또한 다발성 동맥류를 가지거나 혈종을 동반한 환자에서의 비교역시 필 요할 것이다.

동맥류 파열에 의한 급성 뇌지주막하 출혈의 치료에 대한 국내에서 시행된 다기관, 전향적 연구는 부족한 실정 으로 진료지침의 대부분의 근거가 국내 데이터가 아닌 국외 데이터에 의존하고 있음. 또한 국내의 보건데이터 를 이용한 연구에서 혈관내수술을 통한 코일색전술이 개두술에 비해 1년째 사망률이 낮았던 국외의 결과와는 다른 양상을 보였기 때문에, 국내의 전향적, 다기관 데이터 수집을 통한 국내 데이터 기반의 진료지침 개정이 필요하다 할 수 있겠음.

ISAT가 시행 되고나서 20년이 지난 현재, low profile의 스텐트, 더 부드럽고 다양한 코일, 혈류전환스텐트 등 의 다양한 기구들의 개발 및 다양한 테크닉의 발전들로 인해 동맥류의 재발률은 점차 낮아지고 있으며, 파열된 동맥류 환자에서 그 안정성과 실효성은 입증되어 현재 널리 치료되고 있다. 기술, 기기 개발 뿐만 아니라, 약물 치료 또한 질적 향상이 이루어져왔다. 파열성 뇌동맥류의 치료에서 급성 뇌경색의 합병증을 막기위한 티로피반 (tirofiban)의 안정성과 실효성 역시 입증되어 있다. 이런 시대적, 기술적 상황이 변했다는 점과 ISAT자체의 한 계점에 대한 재평가가 필요할 것으로 생각된다.

1-2. 연구개발 대상의 국내외 현황

- 뇌동맥류(Cerebral aneurysm)란 뇌동맥의 일부에 결손이 생겨 그 부분이 도출된 것을 의미하는데, 구체적 으로 뇌혈관 일부가 약한 경우 혈관벽이 늘어나 꽈리모양으로 불거져 나오는 것을 말함.
- (진단) 뇌동맥류가 파열된 경우 뇌컴퓨터단층촬영(CT촬영), 뇌혈관조영술로 알 수 있으며, 이외추가적으로 자기공명혈관조영술(MRA)로 추가적인 정보를 얻을 수 있음.
- (치료) 뇌동맥류의 재출혈을 예방하는 목적으로 수술적 치료를 진행함.



- ▶ 뇌동맥류 결찰술: 대표적인 수술법으로 개두술 방식으로 클립을 사용해 동맥류 경부직접결찰(direct neck clipping) 하는 방식으로 현미경하 미세수술 진행함.
- ▶ 코일색전술: 동맥류 경부직접결찰이 어려운 경우. 개 두술을 시행하지 않고 혈관내 치료법(endovascular treatment)으로 백금코일. 스텐트 등을 동맥류내에 삽입하 여 동맥류를 정상혈류로부터 차단함으로써 혈전형성을 유 도하는 방법임.

연구의 목표 및 내용

최종 목표: 파열성 뇌동맥에서 코일 색전술과 클립 결찰술의 유효성 안정성

- 1. 뇌동맥류 파열 환자에서 코일색전술과 클립결찰술의 결과 비교
 - A. 단기 및 장기 사망률
 - B. 기능적 예후
 - C. 치료 시간/ 입원기간 비교
 - D. 병원비용 비교
- 2. 코일색전술과 클립결찰술의 유효성 비교
 - A. 재치료율

- B. 재발율
- C. 재출혈발생률
- D. 뇌혈관연축 발생률, 그리고 이로인한 후유장애 비교

3. 스텐트 보조하 코일 색전술의 단기 및 장기 결과 비교

- A. 연구 시작~WFTIN 까지의 결과 비교
- B. 시술중 합병증 발생 조사
- C. 시술후 추적 관찰중 동맥류 변화 비교

연구의 추진전략 및 방법

- 1) 다기관 레지스트리를 통한 뇌동맥류 파열 환자 수집
- 2) 권역 심뇌혈관센터, 권역 응급센터 지정 병원 중 KoNES 인증의 및 KSCVS 인증의의 수술과 시술 환자 데 이터 수집
- 3) 환자 중증도별/ 동맥류 위치별 분류에 따른 결과 비교
- 4) 스텐트 사용 유무에 따른 비교

연구 결과의 활용방안 및 기대성과

뇌지주막하출혈 환자 치료에서 클립결찰술과 코일색전술을 비교한 연구는 의료 분야에서 중요한 정보를 제공 하며, 이를 통해 다음과 같은 활용방안과 기대효과를 고려할 수 있습니다:

1. 환자 선택 및 개별화된 접근:

- 연구 결과를 기반으로 환자를 선택하고. 치료 방법을 개별적으로 결정할 수 있습니다.
- 동맥류의 위치, 크기, 환자의 상태, 그리고 기타 요인을 고려하여 클립결찰술 또는 코일색전술을 선택합니다.

2. 합병증 및 예후 개선:

• 코일색전술은 혈관경련의 발생률이 낮아 합병증의 위험이 줄어들고 또한, 입원 기간이 짧아지고 비용이 감 소한다고 알려져 있습니다. 검증된 기관의 두 치료를 비교함을써 환자 치료의 질향상에 도모할수 있습니다.

3. 비용 효율성:

• 코일색전술은 수술 시간이 짧고, 입원 기간이 단축되므로 비용 효율적이라고 알려져 있지만 정확한 대규모 연구가 없어서 이를 통해 이는 환자와 의료 기관 모두에게 경제성 비교 분석 데이터를 제공합니다.

4. 종합적인 치료 전략:

- 클립결찰술과 코일색전술은 서로 다른 장단점을 가지고 있습니다.
- 의료 전문가들은 환자의 상태와 동맥류 특성을 고려하여 종합적인 치료 전략을 수립할 수 있습니다.

5. 연구 지속 및 개선:

- 해당 연구를 기반으로 더 많은 연구를 진행하여 치료 방법을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
- 새로운 기술과 접근법을 탐색하고, 환자의 예후를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

기타사항

참고문헌

- 1. Kägi G, Schurter D, Niederhäuser J, De Marchis GM, Engelter S, Arni P, et al. Swiss guidelines for the prehospital phase in suspected acute stroke. Clinical and Translational Neuroscience. 2021;5(1):2514183X21999230.
- 2. Kothari RU, Pancioli A, Liu T, Brott T, Broderick J. Cincinnati prehospital stroke scale: reproducibility and validity. Annals of emergency medicine. 1999;33(4):373-8.
- 3. Zhelev Z, Walker G, Henschke N, Fridhandler J, Yip S. Prehospital stroke scales as screening tools for early identification of stroke and transient ischemic attack. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019(4).
- 4. Duvekot MH, Venema E, Rozeman AD, Moudrous W, Vermeij FH, Biekart M, et al. Comparison of eight prehospital stroke scales to detect intracranial large-vessel occlusion in suspected stroke (PRESTO): a prospective observational study. The Lancet Neurology. 2021;20(3):213-21.
- 5. Bergs J, Sabbe M, Moons P. Prehospital stroke scales in a Belgian prehospital setting: a pilot study. European journal of emergency medicine. 2010;17(1):2-6.
- 6. Brekenfeld C, Goebell E, Schmidt H, Henningsen H, Kraemer C, Tebben J, et al. 'Drip-and-drive': shipping the neurointerventionalist to provide mechanical thrombectomy in primary stroke centers. Journal of NeuroInterventional Surgery. 2018.
- 7. de la Ossa NP, Abilleira S, Jovin TG, García-Tornel Á, Jimenez X, Urra X, et al. Effect of direct transportation to thrombectomy-capable center vs local stroke center on neurological outcomes in patients with suspected large-vessel occlusion stroke in nonurban areas: the RACECAT randomized clinical trial. Jama. 2022;327(18):1782-94.
- 8. Romoli M, Paciaroni M, Tsivgoulis G, Agostoni EC, Vidale S. Mothership versus drip-and-ship model for mechanical thrombectomy in acute stroke: a systematic review and meta-analysis for clinical and radiological outcomes. Journal of stroke. 2020;22(3):317.
- 9. Milne MS, Holodinsky JK, Hill MD, Nygren A, Qiu C, Goyal M, et al. Drip 'n ship versus mothership for endovascular treatment: modeling the best transportation options for optimal outcomes. Stroke. 2017;48(3):791-4.
- 10. Holodinsky JK, Patel AB, Thornton J, Kamal N, Jewett LR, Kelly PJ, et al. Drip and ship versus direct to endovascular thrombectomy: the impact of treatment times on transport decision-making. European stroke journal. 2018;3(2):126-35.
- 11. Molyneux A. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. The Lancet. 2002;360(9342):1267–74.
- 12. Velasco González A, Stracke P, Nordmeyer H, Heddier M, Saleme S, Sauerland C, et al. Low rates of recanalization for wide-necked aneurysms treated with stenting after balloon-assisted coiling: combination of techniques delivers stable and improved results during follow-up. Neuroradiology. 2018;60:1223-30.
- 13. Xue G, Zuo Q, Tang H, Zhang X, Duan G, Feng Z, et al. Comparison of low-profiled visualized intraluminal support stent-assisted coiling and coiling only for acutely ruptured intracranial aneurysms: safety and efficacy based on a propensity score-matched cohort study. Neurosurgery. 2020;87(3):584-91.
- 14. Oushy S, Rinaldo L, Brinjikji W, Cloft H, Lanzino G. Recent advances in stent-assisted coiling of cerebral aneurysms. Expert review of medical devices. 2020;17(6):519-32.
- 15. Chen Z, Xin Y, Zou L, Ma J, Yang C. Safety and effectiveness of stent-assisted coiling with adjunctive techniques in ruptured acute aneurysms: a propensity score-matched cohort study. Journal of Neurosurgery. 2023;1(aop):1-10.
- 16. Ma Y, Jia C, Zhang T, Feng Y, Chen X, Zhao W. Safety and efficacy of intravenous tirofiban for stent-assisted coiling in acutely ruptured intracranial aneurysms: A single center experience. Interventional Neuroradiology. 2022;28(4):476-81.

연구 책임자 서약서

연구과제명:

본인은 대한뇌혈관내치료의학회 연구비 지급 규정 제 7 조에서 정한 연구비 수혜자의 의무를 이행하지 못할 경우 제재 조치 (연구비 환수 조치)에 따를 것을 서약합니다.

2024 년 04 월 16 일

연구 책임자 <u>권 순 찬</u>

Southan Kurn

연구 책임자 <u>오 재</u>상

대한뇌혈관내치료의학회 귀중

총괄 실행예산 내역서

구분 비목	세 부 내 역	금액 (원)	비율
1. 연구원 인건비			
2. 여비	국내 출장 여비 1회 인 평균 * 예상횟수 회		
	참고문헌 구입비		
3. 기술정보활동비	회의 개최비용 1회 * 예상횟수 회	5,000,000	
	원고료, 번역료, 통역료	3,000,000	
	전문가 자문료 1회 * 예상횟수 회	2,000,000	
4. 연구기자재구입비	연구기자재 구입비		
5. 시설비 및 기자재	회의장 임차료		
임차료	1회 * 예상횟수 회 장비 사용료		
6. 재료 및 전산처리비	재료비		
	인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비	5,000,000	
7. 수용비 및 수수료	사무용품비	5,000,000	
	제세공과금		
총 액		20,000,000	100%

^{*} 재료비 세부내역은 별도의 서식(첨부)을 사용하십시오.

^{*} 연구의 성격에 따라 필요한 비목에 대해서만 계상하십시오.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT 2024

МЕМО			

대한뇌혈관내치료의학회 연구비 신청서

연구 과제명	(국문) 급성 허혈성 뇌졸중 치료 연구를 위한 새로운 혈전 모델 개발				
연구기간	(영문) Development of a Novel Thrombus Model for Investigating Acute Ischemic Stroke Treatments 연구과제 선정 후 1 년				
	(성명) (국문) 안 홍 석 (영문) Ahn Hong Suk				
	(소속) 강동성심병원	(3,0)			
연구 책임자	· (직위) 임상조교수 (전문과목) 신경외과				
	(E-mail) <u>academy.upfall2@gmail.</u>	<u>.com</u>			
	(전화) 02-2224-2236	(휴대전화) 010-9198-4530			
연구비 종류	□ 기초, 🗹 임상	(예산안) 1000 만원			
IRB 심의	□ 승 인, ☑ 제출 – 심의중, □ 해당 없음				
본인 (등	:)은 대한뇌혈관내치료의학회 연구	내를 소정의 서류를 갖추어 신청합니다.			
	2024 년 04	4 월 29 일			
연구착	백임자 직위: <u>임상조교수</u>	성명: <u>안 홍 석 (1)</u>			
공동인	변구자 직위:교수대우	성명: 이 종 영 /인)			
	직위:	성명: (인)			
	직위:	성명: (인)			
	직위:	성명: (인)			
	직위:	성명:(인)			

연구계획서

1. 연구의 배경 및 필요성

급성 허혈성 뇌졸중은 적절한 치료가 이루어지지 않을 경우 예후가 매우 불량한 질환입니다. 이를 개선하기 위 해 혈전제거술이 널리 사용되고 있으며, 이 시술의 적용 범위는 계속해서 확대되고 있습니다. 시술 기술과 장비 의 발전은 이러한 확대의 주된 이유 중 하나로 꼽힙니다. 따라서 혈전의 유형에 따라 가장 적합한 시술 방법 및 장비를 선정할 수 있다면, 치료 성공률을 높일 수 있을 것입니다.

이러한 배경을 바탕으로, 본 연구는 급성 허혈성 뇌졸중 치료에서 혈전의 종류를 고려한 맞춤형 혈전제거술의 효과성 및 안전성을 평가하는 것을 목표로 합니다. 혈전의 물리적 특성(예: 경도, 크기, 형태 등)에 기반하여 최 적의 시술 방법과 장비를 선정함으로써, 치료의 예후를 개선하고자 하는 것이 본 연구의 목표입니다.

2. 연구의 목표 및 내용

- 1. 일차적인 목표는 재현 가능한 혈전 제작 프로토콜 확립입니다. Platelet과 RBC의 조성을 변경해가며, 흔히 fibrin-rich clot과 RBC-rich clot이라고 불리는 혈전을 원하는 대로 만들고자 합니다.
- 2. 만들어진 혈전을 이용하여 silicone model에서 적절한 혈전제거술 방법을 확인합니다. 조성에 따라 aspiration thrombectomy가 유리한 경우도 있을 것이고, mechanical thrombectomy, 혹은 combined treatment가 유리한 경우도 있을 것입니다.
- 3. 임상으로의 적용을 위해 실제 환자에서의 결과와 비교합니다. 만들어진 혈전을 stent 혹은 aspiration 을 통해 제거해보고, 실제 환자에서 제거된 thrombus와 비교합니다. 이를 통해 시술을 시행한 환자의 thrombus 조성이 어떤 model과 가장 비슷하였는지 역추적할 수 있습니다.
- 4. 만들어진 혈전을 CT 등의 영상검사를 통해 환자의 시술 전 영상검사와 비교합니다. 이를 통해 추후 환자의 시술 전 검사를 보고 적절한 치료 방법을 결정할 수 있습니다.

3. 연구의 추진전략 및 방법

본 연구에서는 인공적으로 혈전을 생성하여 칼슘화된 뇌색전증(Calcified Cerebral Emboli, CCE)을 모사하는 뇌혈관 실리콘 모델 내에서 대혈관 폐쇄를 재현하고, 다양한 내혈관 치료 전략의 효율성을 평가할 예정입니다. 이를 위한 구체적인 방법은 다음과 같습니다.

- 1. 원심분리를 통한 혈액 성분 분리: 혈액을 특정 속도로 원심 분리하여 적혈구(RBC)와 혈소판(platelet)을 분 리합니다.
- 2. 혈전 생성을 위한 혈액 성분 혼합: 분리된 적혈구와 혈소판을 특정 비율로 혼합합니다. 이 비율은 실제 혈전 생성 과정을 가능한 한 정확하게 모방하기 위해 선정됩니다. 혼합된 혈액 성분은 응고 반응을 일으키기 위해 특정 조건 하에서 응고시킵니다.
- 3. 인공 혈전의 사용: 생성된 혈전은 실리콘으로 제작된 뇌혈관 모델 내에 위치시켜 뇌혈관 폐쇄 상황을 재현합 니다.
- 4. 혈관내 치료 전략의 평가: 이 모델을 사용하여, 현재 사용 가능한 다양한 내혈관 치료 기기와 기법들의 효과

를 평가합니다. 혈전의 종류에 따른 가장 효과적인 재개통 방법을 확인합니다.

4. 연구 결과의 활용방안 및 기대성과

본 연구의 접근 방법은 급성 허혈성 뇌졸중 치료에 있어서 재개통률을 개선할 수 있는 치료계획을 수립하는데 중요한 기초 자료를 제공할 것입니다. 또한 실제 인체 상황에 더 가까운 조건에서의 치료 전략 개발이 가능해질 것으로 기대됩니다.

5. 기단사항

혈전 생성을 위해 동맥혈에서 채취한 혈액 샘플이 필요하며. 이를 위해 환자로부터 동의를 받아야 합니다. 이에 따른 절차는 다음과 같습니다:

- 1. 환자 동의서 작성: 연구 참여를 위해 동맥혈 샘플을 제공하는 환자들로부터 명확한 동의를 얻기 위해 동의서 를 작성합니다. 이 동의서에는 혈액 샘플 채취 목적, 절차, 잠재적 위험 및 이익 등에 대한 자세한 정보가 포 함되어야 합니다.
- 2. 환자 선정과 동의: 연구에 적합한 환자를 선정한 후, 해당 환자들에게 연구 목적, 예상되는 위험 및 이점 등 에 대해 충분히 설명하고, 자발적인 참여 동의를 얻습니다. 환자의 정보와 동의 과정은 철저히 기록되어야 합니다.
- 3. 위해 방지를 위한 조치: 연구 참여로 인해 환자들에게 중대한 위해가 가해지지 않도록 하며, 모든 절차는 환 자의 안전과 복지를 최우선으로 고려하여 수행됩니다.
- 4. IRB 심의: 연구 계획서 및 환자 동의서를 포함한 모든 관련 문서를 IRB에 제출하여 심의를 받습니다. IRB는 연구의 윤리적 적절성, 환자의 권리 보호, 연구의 과학적 타당성 등을 평가하여 연구 수행 여부를 결정합니다.

이러한 절차를 통해 연구의 윤리적 기준을 준수하며, 동맥혈 샘플을 이용한 혈전 생성 연구를 안전하고 효율적 으로 수행할 수 있습니다

6. 참고문헌

- 1. Dobrocky T, Piechowiak E, Cianfoni A, Zibold F, Roccatagliata L, Mosimann P, et al. Thrombectomy of calcified emboli in stroke. Does histology of thrombi influence the effectiveness of thrombectomy? J Neurointerv Surg. 2018;10(4):345-50.
- 2. Duffy S, Farrell M, McArdle K, Thornton J, Vale D, Rainsford E, et al. Novel methodology to replicate clot analogs with diverse composition in acute ischemic stroke. J Neurointerv Surg. 2017;9(5):486-91.
- 3. Johnson S, Chueh J, Gounis MJ, McCarthy R, McGarry JP, McHugh PE, et al. Mechanical behavior of in vitro blood clots and the implications for acute ischemic stroke treatment. J Neurointerv Surg. 2020;12(9):853-7.
- 4. Johnson S, McCarthy R, Fahy B, Mereuta OM, Fitzgerald S, Gaudirc J, et al. Development of an in vitro model of calcified cerebral emboli in acute ischemic stroke for mechanical thrombectomy evaluation. J Neurointerv Surg. 2020;12(10):1002-7.

- 5. Johnson S, McCarthy R, Gilvarry M, McHugh PE, McGarry JP. Investigating the Mechanical Behavior of Clot Analogues Through Experimental and Computational Analysis. Ann Biomed Eng. 2021;49(1):420-31.
- 6. Leischner H, Flottmann F, Hanning U, Broocks G, Faizy TD, Deb-Chatterji M, et al. Reasons for failed endovascular recanalization attempts in stroke patients. J Neurointerv Surg. 2019;11(5):439-42.
- 7. Maegerlein C, Berndt MT, Monch S, Kreiser K, Boeckh-Behrens T, Lehm M, et al. Further Development of Combined Techniques Using Stent Retrievers, Aspiration Catheters and BGC: The PROTECT(PLUS) Technique. Clin Neuroradiol. 2020;30(1):59-65.
- 8. Ricalde P, Caccamese J, Norby C, Posnick JC, Hartman MJ, von Fraunhofer JA. Strength analysis of 6 resorbable implant systems: does heating affect the stress-strain curve? J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(12):2493-7.
- 9. Xiong J, Wang SM, Zhou W, Wu JG. Measurement and analysis of ultimate mechanical properties, stress-strain curve fit, and elastic modulus formula of human abdominal aortic aneurysm and nonaneurysmal abdominal aorta. J Vasc Surg. 2008;48(1):189-95.

연구 책임자 서약서

연구과제명: Development of a Novel Thrombus Model for Investigating Acute Ischemic Stroke Treatments (급성 허혈성 뇌졸중 치료 연구를 위한 새로운 혈전 모델 개발)

본인은 대한뇌혈관내치료의학회 연구비 지급 규정 제 7 조에서 정한 연구비 수혜자의 의무를 이행하지 못할 경우 제재 조치 (연구비 환수 조치)에 따를 것을 서약합니다.

2024 년 04 월 29 일

연구 책임자 안 홍 석

대한뇌혈관내치료의학회 귀중

총괄 실행예산 내역서

구분 비목	세 부 내 역	금액 (원)	비율
1. 연구원 인건비			
2. 여비	국내 출장 여비 1회 2인 평균 60만 * 예상횟수 3회	1,800,000	18%
	참고문헌 구입비		
3. 기술정보활동비	회의 개최비용 1회 200,000 * 예상횟수 2회	400,000	4%
	원고료, 번역료, 통역료	1,500,000	15%
	전문가 자문료 1회 200,000 * 예상횟수 3회	600,000	6%
4. 연구기자재구입비	연구기자재 구입비	1,800,000	18%
5. 시설비 및 기자재 임차료	장비 사용료	N/A	
6. 재료 및 전산처리비	재료비	2,500,000	25%
	인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비		
7. 수용비 및 수수료	사무용품비	400,000	4%
	제세공과금	1,000,000	10%
총 액		10,000,000	100%

^{*} 재료비 세부내역은 별도의 서식(첨부)을 사용하십시오.

^{*} 연구의 성격에 따라 필요한 비목에 대해서만 계상하십시오.

대한뇌혈관내치료의학회 연구비 신청서

연구 과제명	(국문) 뇌졸중 데이터를 이용한 환자 예후 인공지능 모델 개발				
	(영문) AI using Korean Stroke Registry				
연구기간	연구과제 선정 후 2년				
	(성명) (국문) 오재상	(영문) Jae Sang Oh			
	(소속) 가톨릭대학교 의정부성모	병원			
연구 책임자	(직위) 부교수	(전문과목) 신경외과			
	(E-mail) metatron1324@naver.co	om			
	(전화) 01029183903	(휴대전화) 01029183903			
연구비 종류	□ 기초, V 임상	(예산안) 2,000 만원			
IRB 심의	□ 승 인, □ 3	제출 – 심의중, V 해당 없음			
본인 (등)은 대한뇌혈관내치료의학회 연구비를 소정의 서류를 갖추어 신청합니다. 2024 년 03월 14일					
연구칙	백임자 직위: <u>부교수</u>	성명: 오 재 상			
	공동연구자	2/4/24			
	1) 가톨릭대학교 조교수 2) 순천향대학교 조교수 3) 다고대학교 교수	김민정 /			
	2) 순전향대학교 소교수 3) 단국대학교 교수	고정호 7 2~ 1			
	4) 이제대학교 부교수	구혜원			
	5) 고려대학교 교수	引着なると			

대한뇌혈관내치료의학회 귀중

연구계획서

연구의 배경 및 필요성

- 뇌졸중 치료 및 예후 예측을 위한 임상의사결정지원시스템의 필요성 급격히 변하는 뇌경색 패러다임 변화에 따른 환자-보호자 의사결정에 도움이 필요.
- 현재 기존 소규모 전향 연구와 후향적 연구만으로 현장에서의 의사결정에 한계
- 뇌졸중 같은 응급 질환이 초기 빠른 판단이 예후에 어떤 영향을 미치는지 보여주는 기존 연구들의 한계점이 많 음. 다른 수집된 환자군과 다른 레지스트리로 인한 제한된 환자의 전향적 연구를 통해 정확한 데이터를 제공하여 의사결정에 도움을 주기 어려움.
- 임상의사결정지원시스템의 분야로는 진단지원, 치료방법결정지원, 처방결정지원, 정보검색, 의료영상분석, 위 험알림 등이 있음. 임상의사결정지원모델은 실제 임상 환경에서 임상의의 결정 지원 뿐만 아니라. 환자에게 의사 결정에서의 신뢰성을 주는 역할 또한 있음.
- 인공지능을 통한 임상의사지원결정시스템 연구 현황
- 이스라엘 의료영상 솔루션 업체 MedyMatch 또는, IBM을 통해 인공지능 기반 응급실용 뇌출혈 검출 프로그램 을 전 세계에 배포(2017년).
 - 1) 응급실을 방문한 환자의 뇌 CT영상을 이용해 잠재적으로 출혈이 발생할 수 있는 영역을 5 분 내에 의사에게 알림. 두부 외상이나 뇌졸중이 의심되는 환자들을 진단하고 뇌출혈 여부 확인.
 - 2) 기존 연구들은 대부분 이미지 중심의 데이터이며 결과값으로 예후나 사망과 같은 임상데 이터를 포함하지 않 아 실제 임상 결과와 차이가 커서 임상의사지원결정시스템이라고 보기 어려움.

연구의 목표 및 내용

최종 목표: KONES REGISTRY 이용한 뇌졸중 환자 치료 의사결정 및 예후 예측 인공지능 모델 개발

- 1. 한국 뇌줄중 KONES REGISTRY 레지스트리를 이용한 환자 예후예측 인공지능 모델 개발 인공지능 모델을 통한 급성 뇌경색 환자의 예후 모델 제시
- 2. 인공지능 모델에서 위험인자 변화를 통한 뇌경색 환자 예후 변화 모델제시
- 3. Kones Registry를 통한 인공지능을 통한 뇌졸중 치료 의사결정 시스템 구축
- 4. 마이 데이터 기반 뇌졸중 환자 장기 예후 예측 모델 제시

연구의 추진전략 및 방법

- 급성기 뇌졸중 Kones registry 모델 생성 프로토콜
 - 1) 레지스트리에서 급성기 뇌경색 환자의 선별
 - 2) 정확한 증상 발현 시간, 정확한 임상 척도 데이터 있는 환자 선별
 - 3) 개인 비식별화 코드와 환자 내원 날짜를 기준으로 빅데이터 병합

- 4) 급성 뇌졸중 환자 시긴과 초기 치료 등에 따른 단기 및 장기 예후 예측 모델
- 5) 뇌졸중 위험인자에 따른 장기 뇌졸중 발생 위험과 재발 검증 모델
- 6) 데이터 전처리 및 병합
- 7) 생성 모델 개발
- 8) 정확도 예측
- 9) 모델 개발을 통합 앱 또는 사이트 개발

연구 결과의 활용방안 및 기대성과

- 뇌혈관질환에서의 인공지능 방법론 적용에서의 프로토콜 정립 다른 질환의 환자에서의 머신러닝 및 딥러닝 적 용 프로토콜을 제시 가능함.
- 응급 환자안전 관리 대응 의사결정 시스템 개발
- 한국형 뇌경색 환자의 인공지능 모델을 통한 예후 예측 애플리케이션 개발 응급실 환자 내원 후 뇌경색 환자 변수, 치료 병원, 치료 변수를 추가 시에 사망률 감소와 예후 호전률, 효율적인 의료비 감소 효과를 제시하여 환 자 보호자의 치료 결정 참여도를 늘 리고 치료의 의사결정에 참여하는 시스템 개발
- 급성기 촉박한 치료 시간 동안, 의사결정의 어려움을 환자, 보호자와 의료진 모두에 도움이 되는 적절한 환자-보 호자-의사 동시 결정 패러다임 전환의 제공. 이를 통해 치료 의사결정 참여하는 환자와 보호자가 치료 만족도를 올릴수 있고 본인의 치료 선택에 책임을 질 수 있는 패러다임 변화 구축
- 한국형 뇌경색 환자의 인공지능 모델을 통한 예후 예측 애플리케이션 개발

기타사항

KONES REGISTRY 를 통한 인공지능 모델 개발을 통해 한국 레지스트리형 예후 예측 모델을 개발하겠습니다. 우선 뇌경색 위주로 진행하겠습니다만, 추후 뇌출혈 모델로 개발 후속도 추진 하겠습니다.

참고문헌

- 1. Hackert MQN, Ankersmid JW, Engels N, Prick JCM, Teerenstra S, Siesling S, et al. Effectiveness and implementation of SHared decision-making supported by OUTcome information among patients with breast cancer, stroke and advanced kidney disease: SHOUT study protocol of multiple interrupted time series. BMJ Open. 2022;12(8):e055324.
- 2. Lazaridis C, Mansour A. To Decompress or Not? An Expected Utility Inspired Approach To Shared decision-making For Supratentorial Ischemic Stroke. Neurocrit Care. 2021;34(3):709-13.
- 3. Mehawej J, Saczynski J, Abu HO, Gagnier M, Bamgbade BA, Lessard D, et al. Factors Associated With Patient Engagement in Shared Decision-Making for Stroke Prevention Among Older Adults with Atrial Fibrillation. Can Geriatr J. 2021;24(3):174-83.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT 2024

- 4. Mitropoulou P, Gruner-Hegge N, Reinhold J, Papadopoulou C. Shared decision making in cardiology: a systematic review and meta-analysis. Heart. 2022;109(1):34-9.
- 5. Noseworthy PA, Branda ME, Kunneman M, Hargraves IG, Sivly AL, Brito JP, et al. Effect of Shared Decision-Making for Stroke Prevention on Treatment Adherence and Safety Outcomes in Patients With Atrial Fibrillation: A Randomized Clinical Trial. J Am Heart Assoc. 2022;11(2):e023048.
- 6. Torres Roldan VD, Brand-McCarthy SR, Ponce OJ, Belluzzo T, Urtecho M, Espinoza Suarez NR, et al. Shared Decision Making Tools for People Facing Stroke Prevention Strategies in Atrial Fibrillation: A Systematic Review and Environmental Scan. Med Decis Making. 2021;41(5):540-9.

연구 책임자 서약서

연구과제명:

본인은 대한뇌혈관내치료의학회 연구비 지급 규정 제 7 조에서 정한 연구비 수혜자의 의무를 이행하지 못할 경우 제재 조치 (연구비 환수 조치)에 따를 것을 서약합니다.

2024 년 03 월 14 일

연구 책임자 오 재 상



대한뇌혈관내치료의학회 귀중

총괄 실행예산 내역서

구분 비목	세 부 내 역	금액 (원)	비율
1. 연구원 인건비			
2. 여비	국내 출장 여비 1회 인 평균 * 예상횟수 회		
	참고문헌 구입비		
3. 기술정보활동비	회의 개최비용 1회 * 예상횟수 회	5,000,000	
	원고료, 번역료, 통역료	3,000,000	
	전문가 자문료 1회 * 예상횟수 회	2,000,000	
4. 연구기자재구입비	연구기자재 구입비		
5. 시설비 및 기자재 임차료	회의장 임차료 1회 * 예상횟수 회 장비 사용료		
6. 재료 및 전산처리비	재료비		
	인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비	5,000,000	
7. 수용비 및 수수료	사무용품비	5,000,000	
	제세공과금		
총 액		20,000,000	100%

^{*} 재료비 세부내역은 별도의 서식(첨부)을 사용하십시오.

^{*} 연구의 성격에 따라 필요한 비목에 대해서만 계상하십시오.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

CH한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(급) ~ 22일(토)
장소: 제주애비치호텔

Free Paper IV. Ecstasy session

(Troubleshooting for difficult cases)

6월 22일(토) 10:30-11:30

좌장: 권현조 (충남대)

윤석만 (순천향대)

FP4-1

Arterial puncture of non-femoral site with difficult femoral access for thrombectomy or balloon angioplasty before carotid stenting

Chang-Hyun Kim, Min-Yong Kwon, Chang-Young, Lee

Department of Neurosurgery, Keimyung University School of Medicine

Objective: In the difficult femoral access including difficult aortic arch, vessel tortuosity, bilateral femoral artery severe stenosis, and aortic dissection, endovascular treatment may be prolonged due to difficult femoral route in carotid artery stenosis or acute large artery occlusion.

Methods: And so, we report three cases of arterial puncture of non-femoral site with difficult femoral access for thrombectomy or balloon angioplasty before carotid stenting.

Result: Case presentation 1 A 95-year-old female presented global aphasia, Lt. hemiparesis, and altered mentality with 20 of NIHSS. She had a cardiac disease as left bundle branch block. Stroke CT Angiography showed the occlusion of proximal M1 segment with TICI 0 and tortuous aortic arch. Despite several transfemoral approach, tortuous aortic arch prohibited the angiocatheter advance and cross tortuous vessel. This patient was planned to perform the procedure through direct carotid puncture. Successful recanalization was performed after direct puncture through common carotid artery. Case presentation 2 A 74-year-old female presented hemiparesis and altered mentality with 25 of NIHSS. She had no cardiac disease. Stroke CT Angiography showed the occlusion of distal basilar artery occlusion and tortuous subclavian – vertebral artery orifice. Despite several trans-femoral approach, we cannot cross tortuous vessel of vertebral artery with any devices. This patient was planned to perform the procedure through direct brachial puncture. Successful recanalization was performed after direct puncture through brachial artery. Case presentation 3 A 77-year-old male presented with severe degree of asymptomatic carotid artery stenosis over 70% in local clinics. This patient visited our OPD with recurrent TIA. We cannot approach CCA using transfemoral route. This patient was planned to perform direct carotid puncture. The procedure was performed without any complication. Manual compression over about 30mins was used to close the puncture site.

Conclusion: In the thrombectomy or balloon angioplasty before carotid stenting with the difficult femoral access, non-femoral site direct arterial puncture can be helpful for effective and safe procedure through carotid or brachial artery.

FP4-2

Endovascular Removal of Freely Floating Retained Microcatheter at Aortic Arch with Snare during dural AVF embolization

신승훈

차의과학대 분당차병원

Objective: Glued microcatheter is a rare complication during embolization of arteriovenous malformations (AVMs). Following the availability and popularization of Onyx, the incidence of retained catheters has become lesser. However there have been reports of retained microcatheter during embolization of AVM with Onyx. We report a case of endovascular removal of a freely floating of glued microcatheter during embolization of an arteriovenous malformation with Onyx.

Methods: A 56-year-old man suffers from a posterior occipital arteriovenous fistula with subarachnoid drainage supplied by several feeders (upside pharyngeal aa, right posterior inferior cerebellum aa, left posterior meninges aa, left posterior occipital aa, right relative cerebellum aa)

Result: In the first embolization session, we attempt embolization through the posterior meningeal artery pathway using Onyx 18 HD. However, we cannot completely embolize. Final control angiography shows the remaining right ascending pharyngeal artery and right posterior descending cerebellar artery feeder. And we attempt embolization through the newly recognized right ascending cerebellar artery pathway. After unsuccessful Onyx embolization, we attempt to remove the Apollo microcatheter. However, we cannot remove the microcatheter after a few attempts. So, we decide to maintain the microcatheter at the femoral artery perforation site. In the process of maintaining the microcatheter, the proximal part of the microcatheter was moved to the aortic arch. That's when a portion of the microcatheter enters the left ventricle of the heart. Arrhythmia has developed. We try to remove the microcatheter that freely floats in a 4 cm diameter snare, and finally recover the microcatheter successfully.

Conclusion: Therefore, we report a rare case of successful removal of a free-floating maintenance microcatheter using a large noose during Onyx embolization for posterior tibial sinus with subarachnoid drainage.

FP4-3

Life-threatening massive facial bleeding from pterygoid venous plexus with direct carotid cavernous fistula: A expedite embolization of cavernous sinus

Ahn Seong Yeol

Department of Neurosurgery, Myong ii Hospital

Objective: We will introduce a case that saved a life by neuro-intervention approach

Methods: TFCA showed the carotid cavernous fistula in cavernous sinus (CS) with bleeding in venous plexus in a patient with face injury in a shock

Result: After embolization of CS, vital sign of the patient was stabilized.

Conclusion: The expedite embolization of CS via neuro-intervention solved a shock.

FP4-4

Combined Embolization Technique with WEB and Coil for Basilar Top Irregular-shaped Aneurysm

Yeongu Chung

Department of Neurosurgery, Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University School of Medicine

Objective: The Woven Endobridge (WEB) embolization device, a self-expanding mesh which achieves flow disruption allow intra-aneurysmal embolization for wide-neck bifurcation aneurysm without stent or antiplatelet medications. However, due to the shape of the device, it is impossible to cover the entire aneurysmal width if the aneurysmal neck is not centered on the axis. Herein, the author would like to introduce a case of an irregular-shaped basilar top unruptured aneurysm treated with a double microcatheter, using both WEB device and coil.

Methods: A 62 years-old male patient who had a past medical history of hypertension and dyslipidemia presented with headache for 2 weeks. During his admission for viral meningitis, MR angiography showed unruptured basilar top aneurysm. After medical treatment for meningitis, digital subtraction angiography was performed. The aneurysm was 10mm(width) x 5mm(height) sized irregular-shaped and divided into compartments, resembling a daughter sac, due to the atheroma located at posterior wall of aneurysm. And the neck was offset to one side rather than being located in the center of overall aneurysmal width.

Result: Due to the shape characteristics of a WEB device, placing it at the neck would not cover the entire width of the aneurysm. Furthermore, it was determined that if the WEB device does not fit enough within the aneurysm, there is a possibility that the axis of the WEB could rotate and shift position after detachment. Therefore, the daughter sac area was treated by jailing a microcatheter and performing coil embolization. First, WEB device (7/4mm sized) is deployed after jailing of microcatheter in the center of daughter sac and still noted inflow into daughter sac area. Additional 3 coils (3/6mm, 2/3mm and 1/3mm) was inserted into the daughter sac. Finally, completer embolization achieved and WEB device showed stable location.

Conclusion: The WEB device has been successfully used for the treatment of wide-neck bifurcation aneurysms by achieving intrasaccular flow diversion. Here, the author have shared combined embolization technique with both WEB and coil device. The size selection is the one of the most important consideration for the WEB device however, using an alternative technique can help achieve a more complete embolization.

FP4-5

Endovascular treatment for partially thrombosed aneurysm: agony and journey to summit

Jong Min Lee, Soon Chan Kwon

Department of Neurosurgery, Ulsan University Hospital

Objective: Giant partially thrombosed intracranial aneurysms pose significant challenges in management due to their unfavorable natural history and the absence of standardized treatment approaches. Conventional treatments often have difficulty to effectively manage these aneurysms without a high recurrence rates or significant morbidity.

Methods: we will discuss troubleshooting experiences in managing such aneurysms, exploring the strategies employed to navigate through the intricacies encountered during endovascular interventions. Drawing from clinical cases and procedural insights, we highlight the dilemmas faced by clinicians and share practical approaches to address them effectively.

Result: A two-stage endovascular treatment was performed, utilizing balloon occlusion test (BOT) and intraoperative monitoring (IOM) to ensure maximum patient safety, involving stent-assisted Woven EndoBridge (WEB) embolization and bilateral vertebral artery trapping. The procedure successfully isolated the aneurysm, with postoperative imaging confirming no recanalization and intact posterior circulation. The patient showed stable recovery and no neurological deficits during a 7-month follow-up.

Conclusion: This case demonstrates the feasibility and efficacy of the strategic integration of intrasaccular flow diversion using the WEB device and flow reversal by bilateral vertebral artery trapping for treating giant partially thrombosed aneurysms.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌열관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(금) ~ 22일(토)
장소: 제주해비치호텔

Special Lecture


6월 22일(토) 11:30-12:00

좌장: 신승훈 (차의과학대)

느림의 가치 - 제주올레

서명숙

사단법인 제주올레 이사장



























Special Lecture




























Special Lecture




























걷기 지원 프로그램 운영

Special Lecture


















- 제주올레 19코스 서호주 비불먼 트랙 (2015.01) • 제주올레 7코스 - 이탈리아 친쿼테레 (2016. 05)
- 제주올레 18-1코스 그리스 시프노스 트레일 (2016.05)
- 제주올레 19코스 서호주 비불먼 트랙
- 제주올레 11코스 터키 리키아 욜루
- 제주올레 15코스 대만 라크누스 셀루
- 제주올레 16코스 일본 돗토리 워킹리조트












Special Lecture







The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(금) ~ 22일(토)
광소: 제주해비치호텔

Luncheon Symposium I

6월 22일(토) 12:00-13:00

좌장: 고준석 (경희대)

김영우 (가톨릭대)

Initial Clinical Experience of Pipeline[™] Vantage

김성림

가톨릭대 부천성모병원

The real clinical performance of the Avenir coil tailored for the first coil

Shinsuke Sato

St. Luke's International Hospital


Extensive research has confirmed the safety and efficacy of flow diverters and W-EB for the treatment of intracranial aneurysms. Recently, the number of intracranial aneurysm coils performed by single operators has decreased in Japan. However, it may be beneficial to consider coiling as a first option for the treatment of small, irregularly shaped, ruptured and bifurcated aneurysms. With regard to the role of the framing coil in aneurysm treatment, the first coil will adhere to the wall of the aneurysm and it is necessary that the loop of the first framing coil does not collapse after the introduction of additional coils. The Avenir framing coil concept is unique.


The first segment of the coil becomes a loop structure, in addition the flexible wave designed loops of the coil continue from the second segment and finally the tail loop. I think that these designed loop as the framing coil indicate the useful to have the mechanical behaviour that automatically crawls on the wall of aneurysms easily by showing the movement of the coil that a practiced hand does not need the control of the microcatheter. We demonstrate some cases on these performance of the Avenir coil and a size choice in real clinical practice, showing the role of the framing coil as expected.


Next Neuroprotective agents?

이종민


울산대병원














































































































The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT

2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(금) ~ 22일(토)
장소: 제주해비치호텔

Symposium II.


지멘스 3D 영상 기술을 통한 DFT Device (WEB/LVIS Evo) Visibility Improvement & Case Discussion 6월 22일(토) 13:00-14:00


좌장: 신용삼 (가톨릭대) **강현승** (서울대)


The Usefulness of Image Fusion Technique using ARTIS icono for the Evaluation of the WEB Device.


JH Choi¹, WC Cho¹, YS Shin1, B Kim²


Department of Neurosurgery¹ and Radiology², Seoul St Mary's Hospital, The Catholic University of Korea


































































Imaging Protocol and Efforts for Optimal WEB Size Selection


Dong Young Cho, Ja Ho Koo, Eu Kyo Seo

Ewha Womans University Seoul Hospital, Department of Neurosurgery














Symposium II. 지멘스 3D 영상 기술을 통한 DFT Device (WEB/LVIS Evo) Visibility Improvement & Case Discussion

















































11111 Comparison of size between 3D and 2D images






































Measuring volume of aneurysm




Aneurysm Volume Measurement - syngo Aneurysm Guidance

- The dimensions of the parent vessel and the aneurysm including the volume of the aneurysm are automatically calculated.
- Important para-meters such as dome height and dome width as well as the dimensions of the ostium are immediately available.
- Supporting decision making for neuro device decision such as WEB or flow diversion treatment



Aneurysm Volume Measurement - syngo Aneurysm Guidance

- Preparation
- Rotate VRT image to working angulation
- 2) Clip and zoom VRT image for better visualization of Aneurysm





Aneurysm Volume Measurement - syngo Aneurysm Guidance


- 1) Open "Syngo 3D Aneurysm Guidance
- 2) Select aneurysm dome with "Green point" 3) Select two points of parent artery
- (Proximal and distal)


4) Calculation

















































































Checking post-procedural distal vessel patency and wall apposition of device
























PETRA-MRA as a follow-up imaging modality for intracranial aneurysms treated with WEB device

김정재

연세대 세브란스병원

Woven EndoBridge (WEB; Microvention, Aliso Viejo, California, USA) device has been introduced to treat widenecked bifurcation aneurysms (WNBAs). In Korea, the device was approved by the Ministry of Food and Drug Safety and has been utilized since 2021. The previous study reported long-term adequate occlusion of intracranial aneurysms in 79.1~84.1% at 12 months.

The majority of outcome assessments in previous WEB studies to date have been performed with cerebral angiography. Some studies have suggested that MR TOF or CE-MRA may be useful for outcome assessment, but cerebral angiography remains mandatory to detect inadequate occlusion. Pointwise encoding time reduction with radial acquisition subtraction-based MRA (PETRA-MRA; Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) was introduced to reduce metallic artifacts. With Ultra-short echo time (TE), PETRA-MRA has been reported to be useful to evaluate after microsurgical clipping or endovascular treatment of intracranial aneurysms.

In this presentation, the authors will discuss the potential usefulness of PETRA-MRA for evaluating intracranial aneurysms treated with WEB devices. Additionally, we will summarize single institutional experiences and mid- and long-term outcomes of WEB.

[Reference]

Arthur AS, Molyneux A, Coon AL, et al. The safety and effectiveness of the Woven EndoBridge (WEB) system for the treatment of wide-necked bifurcation aneurysms: final 12-month results of the pivotal WEB Intrasaccular Therapy (WEB-IT) Study. J Neurointerv Surg 2019;11:924–30.

Pierot L, Moret J, Barreau X, et al. Safety and efficacy of aneurysm treatment with web in the cumulative population of three prospective, multicenter series. J Neurointerv Surg 2018;10:553-9

Mine B, Tancredi I, Alijishi A et al. Follow-up intracranial aneurysms treated by a WEB flow disrupter: a comparative study of DSA and contrast-enhanced MR angiography. J Neurointerv Surg 2016;8:615-620.

Heo YJ, Kim D, Jeong HW et al. Usefulness of Pointwise Encoding Time Reduction with Radial Acquisition-Magnetic Resonance Angiography after Endovascular Treatment for Intracranial Aneuryms. Interv Neuroradiol 2023;29:20-29.



KoNES 방사선사/간호사 연수교육

Session I. Basics of Anatomy & Devices 6월 22일(토) 08:30-09:30

Angiography: basic setting and anatomy

신동성

순천향대 부천병원

Basic devices for procedures

김소연

가톨릭관동대 국제성모병원



Angiographic devices

- Basic devices for procedures

국제성모병원 김소연



목차

- 1. Sheath
- 2. Guiding catheter
- 3. Angio catheter
- 4. Guidewire
- 5. Intermediate catheter
- 6. Aspiration catheter
- 7. Microcatheter
- 8. Microwire

1. Basic Concepts

Unit

- · Outer Diameter(OD): French system (Fr)
- · Inner Diameter(ID): Inches (inch/")
 - 3 Fr = 1 mm
 - 1 Fr = 0.33 mm

1 mm = 3 Fr = 0.0394 inch = 19 G


- · 5 Fr diagnostic catheter (100cm length)
 - 0.066 inch outer diameter (1.65 mm/5Fr)
 - 0.038 ~ 0.45 inch inner diameter (0.97 1.2 mm)
- · Guidewire: 0.035 inch (0.89mm) angled tip wire, 150 cm length

french	mm	in	french	mm	in
3	1	0.039	12	4	0.158
4	1.35	0.053	13	4.3	0.170
5	1.67	0.066	14	4.7	0.184
6	2	0.079	15	5	0.197
7	2.3	0.092	16	5.3	0.210
8	2.7	0.105	17	5.7	0.223
9	3	0.118	18	6	0.236
10	3.3	0.131	19	6.3	0.249
11	3.7	0.144	20	6.7	0.263

· Aneurysm coiling

	OD	ID
6Fr Guiding	8Fr	0.087"
6Fr Intermediate	084"	070"
10 microcatheter	1.7Fr	017"
014 microwire	014"	


- · Guiding 은 ID 개념, 그 외는 OD 개념
- · 5Fr Angio catheter








1. Sheath















2. Guiding catheter



- Soft atraumatic tip section
 Braid-free soft tip
- · Large ID
 - Improved injections, ability to road map Accommodates variety of interventional devices
- · Lubricious PTFE inner liner
- Enhances mobility of devices
- · Radiopaque shaft
- Provides visibility of body and tip
- · Four segment construction
 - Varies firmness and flexibility from hub (stiffest) to tip (softest)



	OD	ID	Length
Envoy 5F	5F	0.056"	90/100 CM
Envoy 6F	6F	0.070"	90/100 CM
Envoy 7F	7F	0.078"	90/100 CM



2. Guiding catheter

2. Guider Softtip™ XF Guide Catheter / Stryker


. The Boston Scientific Guider Softip® XF Guide C atheters are intended to facilitate the placement of interventional devices into the neurovascular s


Designed for support


- Braided multi-durometer shaft for proximal support with distal flexibility
- Atraumatic soft tip available in three configurations





	Guider soft tip
Outer Diameter (F)	5,6,7,8
Inner Diameter (in)	.053/.064/.073/.086
Usable length (cm)	90,100
Tip shape	Straight 40 MP


















































· Hydrophilic coating: smooth, rapid movement · Nitinol or stainless core: resists kinks · Core: torquability and steerability - Stiff Angled 0.035"/0.89mm 150 - Shapeable STIFF angled 0.035"/0.89mm 150 - Exchange 0.035"/0.89mm 150 0.035"/0.89mm 150 0.035"/0.89mm 260 3 STIFF exchange 0.035"/0.89mm 3











5. Intermediate catheter



















최근 large bore aspiration catheter가 많이 출시되고 있어 IA thrombectomy 시 Direct Aspiration(ADAPT)을 많이 하고 있음
 distal은 soft 하고 향상된 trackability를 보임














7. Microcatheter






























8. Microwire











감사합니다






KoNES 방사선사/간호사 연수교육


Session II. Imaging, Medication & Cases 6월 22일(토) 09:40-10:40


Imaging and medication for acute ischemic stroke


심유식


인하대병원


















































































































Stent retriever or Suction catheter for recanalization


박정현


한림대 동탄성심병원










































































Session II. Imaging, Medication & Cases

















































































KoNES 방사선사/간호사 연수교육

방사선사 보수교육 6월 22일(토) 10:40-12:40

Neuro-intervention case review


홍준희


인천나은병원 심뇌혈관센터





















































































































































































































응급 뇌혈관 중재술의 이해


Understanding of emergency cerebrovascular intervention procedures


KIM SEUNGGI RT. PhD


MYONG JI MEDICAL FOUNDATION HOSPITAL

























응급 뇌혈관 중재시술 장점

첫째, 외과적인 수술보다 덜 침습적.

둘째, 부분마취로도 가능한 경우가 많다.


셋째, 시술 후 회복기간, 입원기간이 짧다.

넷째, 시술을 반복하여 시행

🕮 명지병원

The Korean Society of Cardio - Vascular Interventional Technology 대한인터벤션영상기술학회

KONES



a. Cause

고지혈증, 당뇨, 동맥경화 등에 의해 발생된 혈전이 뇌혈관을 막거나 덩어리 로 떨어져 나가 다른 혈관을 막는 색전증을 유발.

혈전증(Thrombosis)

손상된 혈관 속에서 혈전이 발생하여 혈액의 흐름을 막는 것

- stenosis, dissection

색전증(Embolism)

다른 혈관부위에 혈전 등의 물질이 생겨 혈류를 따라 이동하다 막히는 것

- A-fib, DVT

🕮 명지병원

The Korean Society of Cardio - Necular Interventional Technology 대한인터벤션영상기술학회

Kones

b. Indiation

- * IV t-PA(tissue plasminogen activator; Actilyse)
 - : Last normal time 4.5h(0.9mg/kg) «
- * 증상발생 8~24시간(19.8.1 확대 적용)
 - : IV t-PA recanalization failed

IV t-TPA – recanalization rate 40% Mechanical thrombectomy 60~90%

黨 명지병원

The Xorean Society of Cardio - Nascular Interventional Technology 대한인터벤션영상기술학회

KONES

c. Mechanial Thrombectomy

- * Suction aspiration thrombectomy
 - : Using suction reperfusion catheter (Penumbra, RED, VECTA..)
- * Stent Retriever thrombectomy
 - : Using retrievable stent (Solitaire, Trevo....)
- * Solumbra technique
- : Using retrievable stent + Penumbra (Solitaire, Trevo....)
- * Others technique
- : Suction aspiration + Retrievable stent + Solumbra+ Balloon..


🏟 명지병원


The Xorean Society of Cardo - Valouter Interventional Technology 대한인터벤션영상기술학회


KoNES

c-1. Suction aspiration thrombectomy
















































































1. 의미

4. Drug(Medication)

Particular deposits of the content of

● 특성 1) 수용성(Solubility): 혈관 내에 사용하는 조영제는 반드시 수용성이여야 한다. 2) 방사선 비 투과성(Radiopacity): 입자 당 함유한 요오드 원자 수에 비례 비 투과성이 좋을수록 사용하는 조영제 양을 줄일 수 있다. (ex. Omnopaque 300 -> 1cc 당 300mg의 요오드 함유) 3) 점성(Viscosity): 끈끈함의 정도, 조영제 농도와 온도에 관련. 4) 삼투압(Osmolarity): 수용액에 녹아 있는 입자수에 비례 삼투압이 높으면 혈관 내피 손상, BBB 파괴, 두통 등의 부작용이 증가. 최대한 혈액과 등장성인 Non-ionic dimer 권장 5) 배설(Evacuation): 대부분 신장으로 배설(95%) 정상적인 신기능을 가진 경우 2~3시간 내에 조영제 절반이상 배설된다.

Drug(Medication): Contrast Media Drug(Medication): Contrast Media ◆ 부작용(side effect) ◆ 부작용(side effect) 1) Allergy: 2~5% 2) Contrast-induced nephropathy: 2~7% Urticaria : 조영제 주입 후 48~72시간 사이에 기저치와 비교하여 Cr이 0.5 mg/dL Skin rash or 25% 이상 상승하는 경우 → DM, CKD, anemia, old age => 고위험환자! 20~30%까지 보고 됨... 0.3~0.7% 환자는 투석이 필요할 수도... Mucosal edema Bronchospasm Anaphylaxis . . . → 예방이 최우선 - 이전 조영제 과민반응 유무 → 예방이 최우선 - 이전 조영제 과민반응 유무 - 해조류, 어퍠류와의 연관성은 명확한 근거가 없음 - 해조류, 어퍠류 와의 연관성은 명확한 근거가 없음 → 경미한 증상일 경우 항히스타민제가 도움(Avil, Dexa) → 경미한 증상일 경우 항히스타민제가 도움(Avil, Dexa) → 조영제 사용 최소화, metformin 혼합사용 금지 → IV hydration Hypersensitivity ≠ Allergy 幕명지병원 The Korean Society of Cardio - Vascular Interventional Technology 대한인터벤션영상기술학회 KONES 幕 명지병원 The Korean Society of Cardio - Viscolar Interventional Technology 대한인터벤션영상기술학회

Drug(Medication): Antithrombotic agents Drug(Medication): Antithrombotic agents

항혈소판제(Antiplatelets)

혈류 속도가 빠른 동맥에서는 혈관벽 손상에 의해 혈소판이 활성화되어 빠 른 속도로 혈전이 형성되는데 이러한 혈전에 의해 발생할 수 있는 심근경색, 관상동맥증후군, 뇌졸중 치료/예방을 위해 항혈소판제가 사용된다. 항혈소 판제에는 아스피린, P2Y12수용체 차단제(Ticlopidine, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor), PDE3 억제제(Cilostazole) 등이 있다.

- ✓ Aspirin: PO 100mg/T, GI irritation/bleeding, bronchospasm,
- Reye's syndrome(children) ✓ Clopidogrel: PO 75mg/T(식사 관계 없음)
- → Intracranial hemorrhage: clopidogrel 0.4%, aspirin 0.5%



Tirofiban

- ✓ Small molecule.
- ✓ Half-life 2hours. However, it's effect on platelet for 4~8hours
- → 0.9% 염화나트륨 수용액 또는 5% 포도당 수용액 250ml에서 50ml를 제

하고 이약 50ml(12.5mg)를 채워 mix한다.


- ✓ Bolus(IA): 25µg/kg, 보통 100kg일 경우 최대 2.5mg까지
- ✓ Maintenance(IV): 0.15 µg/kg/min(12~24hours)
- ✓ 시술 중 생긴 급성 혈전 제거 Tirofiban(aggrastat) →IA, IV 심장 혈관에 허가 받은 약제로 허가약품초과사용 승인 후 사용 가능한 유 일한 약제

후 명지병원



KONES

KONES




Drug(Medication): Antithrombotic agents


항응고제(Anticoagulants)


혈류 속도가 느린 정맥이나 심방에서의 혈전 발생(ex. 심방세동)은 혈류가 제 대로 흐르지 못하는 울혈이 주된 원인인데 이때는 응고경로가 활성화 되어 혈 전이 형성된다. 이러한 혈전/색전증 예방 및 치료에 항응고제가 사용된다. 항 응고제에는 와파린, 헤파린, 저분자량 헤파린(LMWH), 직접/간접 Xa인자억제 제, 직접 트롬빈 억제제(**DTI**) 등이 있다.


특히 NOAC(New oral anticoagulants)이라는 경구용 항응고제가 개발되어 와파린의 많은 단점들(INR 조절, 음식/약물 상호작용 등)을 해결할 수 있게 되 었다.


黨 명지병원 The Koman Society of Cardo - Vascular interventional Sectoropy 대한인터벤션영상기술학회 KoNES




























The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT 2024

대한뇌혈관내치료의학회

Patience and passion

일시: 2024년 6월 21일(금) ~ 22일(토)

장소: 제주해비치호텔



E-Poster							
1	Popliteal artery occlusion during mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke	01영섭 (대구굿모닝병원)					
2	Aspiration boosted stent retrieval thrombectomy: personal experience 2 case	강재성 (분당제생병원)					
3	Case report: Treatment of Severe cerebral vasospasm	김현곤 (분당제생병원)					
4	Delayed Coil Migration from Anterior Communicating Aneurysm: A Rare Complication	박민 (유성선병원)					
5	응급 뇌졸중 치료 가이드라인 제정	오재상 (가톨릭대 의정부성모병원)					
6	Carotid artery stenting following CEA in acute stroke by complete ICA atherosclerotic occlusion	박상규 (연세대 강남세브란스)					
7	Transradial WEB Embolization of a Basilar Tip Aneurysm: A Technical Note and Literature Review	김동섭 (가톨릭대 인천성모병원)					
8	Histological Study of the Normal Vertebral Artery -Hypothetical Induction Site of Dissecting Aneurysms-	김수빈 (순천향대 부천병원)					

P-1

Popliteal artery occlusion during mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke

Young sub Lee, Duk-Ho Goh

Department of Neurosurgery, Daugu Goodmorning Hospital

Objective: There is a case that I experienced for the first time as a neurosurgeon, and it had an occlusion of the ipsilateral popliteal artery during endovascular treatment and subsequently performed peripheral thrombectomy

Methods: The patient was a 87-year-old female patient who visited the hospital on 119 because stuporous mentality and left hemiparesis. Brain MRI/MRA performed in our hospital showed right MCA M1 oocclusion and a.fib was observed on EKG. Since it was 1 hour after symptom onset, tPA was used immediately, and the patient was transferred to the angio room for endovascular treatment. After general anesthesia and femoral puncture with 9Fr, the balloon guiding catheter was placed in the right proximal ICA, and the angiogram showed that the thrombus of MCA M1 was distally migrated and located in MCA M3-4. It was not a thrombectomy case, so I removed the femoral sheath, but a clot appeared at the end of the femoral sheath. The right femoral angiography was performed by puncturing again for the left femoral angiography . Angiography was performed, and occlusion of the popliteal battery was observed. We are not equipped with device capable of performing peripheral thrombectomy. But, aspiration thrombectomy was performed three times using the React 068 aspiration catheter. Finally angiogram showed that popliteal artery became a recanalization.

Result: During endovascular treatment for acute ischemic stroke, popliteal artery occlusion occurred, but thrombectomy was performed and fortunately, it became a recanalization.

Conclusion: Always perform femoral angiography after a endovascular treatment through the femoral artery

Aspiration boosted stent retrieval thrombectomy: personal experience 2 case

Jae Seong Kang

Department of Neurosurgery, Bundang Jesaeng General Hospital, Daejin Medical Center

Objective: I would like to share an impressive thrombectomy case that I performed for a distal ICA occlusion during the period of April 1, 2024 to May 10, 2024. The first case was a 79-year-old man who was diagnosed with Lt. MCA territory infarction due to left distal ICA occlusion and underwent thrombectomy. The second case was a 90-year-old woman who was diagnosed with left MCA territory infarction due to left distal ICA, M1 occlusion and underwent thrombectomy.

Methods: An 8Fr Flowgate balloon guiding catheter, RED 62 aspiration catheter, Trevo trak 21 microcatheter, and synchro 14 microwire were used. Stent deployment was performed using a Trevo stent 4x28mm to fully cover the occlusion site, followed by an attempt to advance the aspiration catheter to the occlusion site for combined thrombectomy, but the aspiration catheter was unable to advance due to an athero-stenotic cavernous ICA segment, carotid siphon. However, before thrombectomy, an aspiration catheter was placed at the stent proximal marker and stent retrieval thrombectomy was performed with aspiration, and the first pass was successful. A large volume of thrombus was identified. The second case was exactly the same as the first, using an 8Fr Flowgate balloon guiding catheter with a RED 62 aspiration catheter, Trevotrak 21 microcatheter, synchro 14 microwire, and Trevo stent 4x28mm. Before stent retrieval, the aspiration catheter was stuck in the athero-stenotic cavernous ICA segment, carotid siphon, and the aspiration catheter could not be advanced, but the difference from the previous time was that the stent retrieval thrombectomy was performed alone without performing aspiration together due to a technical error, and recanalization was not performed. So next time, I performed a stent retrieval thrombectomy with aspiration with the aspiration catheter positioned at the stent proximal marker near the carotid siphon, and succeeded in passing. A moderate volume of thrombus was identified.

Result: In distal ICA occlusions with severe atherosclerosis in patients over 70 years of age, the aspiration catheter may not advance far enough to effectively perform combined thrombectomy. However, even in this case, if the aspiration catheter is placed only at the stent proximal marker site and aspiration is performed while stent retrieval is performed, it is thought that aspiration can help remove the thrombus by compressing the surrounding parent artery where the thrombus exists by temporarily eliminating the gap between the stent and the artery wall. Even if the distal tip of the aspiration catheter does not contact the thrombus, we experienced a significantly higher recanalization rate when aspirating near the stent proximal marker with performing stent retrieval.

Conclusion: Therefore, the combination of the Aspiration catheter and stent is thought to contribute to better outcomes in thrombus removal than the stent alone.

P-3

Case report: Treatment of Severe cerebral vasospasm

Kim hyungon

Department of Neurosurgery, Bundang Jaesang Hospital

Objective: A cerebral vasospasm is a complication that occurs after subarachnoid hemorrhage, and is an important complication that causes death and neurological deficits in patients. The treatment of vasospasm is an important factor in determining the patient's prognosis

Methods: 45-year-old man who is occurred severe headache suddenly is diagnosed with subarachnoid hemorrhage, right vertebral artery dissecting aneurysm is ruptured, in emergency room with headache. Emergency coil embolization is proceeded, Lt veretral artery was trapped. Daily transcranial Doppler(TCD) was performed, both HI index(Vmca/Vica) is below 3, but patient was drowsy, motor of low extremity was grade II.

Result: So, TFCA was performed and diagnosed that Lt VA was occluded, Rt VA and BA were severely constricted. Drug angioplasty was treated using Nimodipin 3mg at POD7, 8.. Severe vasospasm was observed at POD 8 still, so firstly stentretriver angioplasty was performed, but vasospasm was slightly improved and still severe. Secondly balloon angioplasty using gateway 2.0mmx 9mm was performed and vasospasm was mostly improved. Another 6 drug angioplasty were treated, vasospasm was not seen in TFCA at POD16.

Conclusion: TCD is a non-invasive and useful examination for diagnosing vasospasm, but even if it is in a normal level, cerebral angiography should be performed to confirm the vascular constriction considering clinical symptoms. Drug angioplasty, stentretriever angioplasty, and balloon angioplasty were a very useful treatment for vasospasm, which should be performed until being improved.

The 18th Annual Summer Conference on Endovascular Neurosurgical Therapy

ASCENT 2024

P-4

Delayed Coil Migration from Anterior Communicating Aneurysm: A Rare Complication

Min Park

Department of Neurosurgery, Yuseong Sun Medical Center

Objective: Coil migration is an infrequent but potentially grave complication following cerebral aneurysm embolization, which can transpire early or late in the postoperative period. This study aims to discuss a rare case of delayed coil migration from an anterior communicating artery aneurysm and review the potential factors contributing to this complication.

Methods: We report the case of a 51-year-old male with a ruptured anterior communicating artery aneurysm who underwent coil embolization using the double microcatheter technique without stent insertion. The patient presented with left leg weakness and gait disturbance twelve days post-procedure, and brain magnetic resonance angiography (MRA) showed coil migration to the right A2 segment. On postoperative day 20, an endovascular procedure was performed to fix the migrated coil.

Result: This study highlights the rarity of delayed coil migration, emphasizes the importance of considering this complication, and discusses the possible contributing factors, including aneurysm shape, site, broad neck, low dome-to-neck ratio, coil size and design, use of soft coils, microcatheter kickback, and cerebral vasospasm.

Conclusion: Although delayed coil migration after endovascular treatment for an aneurysm is exceedingly rare, it poses a risk of severe ischemic complications. Therefore, it is crucial to acknowledge the possibility of this infrequent complication and implement strategies to minimize its occurrence.

P-5

응급 뇌졸중 치료 가이드라인 제정

오재상¹, 이종민³, 박석규², 권순찬³

¹가톨릭대학교, ²순천향대학교, ³울산대학교

Objective: 필수의료가 부족한 한국의 실정과 초기 환자 이송과 치료결정 가이드라인의 부족 • 필수의료인 뇌혈관 질환의 대표적인 직업군은 신경외과 의사가 노쇠화되고 점차 개두술등 어려운 고난이도 수술이나 시술을 담당하는 의사들이 감소하는 실정으로 충분한 시스템 구축과 지원이 없이 이루지는 현실임. • 아산병원 간호사와 같은 이슈가 발생해서 대대적인 국가적인 책임의식과 필수의료 전체적인 환자 시스템에 대한 가이드리안이 필요한 실정임. • 보 건복지부는 24년 1월부터 인적네트워크 사업을 바탕으로 급성뇌졸중 치료 지역 네트워크체를 구성하기 시작함. 직 접 최종치료 전문가가 해당지역의 이송을 필요로 하는 급성 뇌졸중 환자 (뇌경색/뇌출혈 모두 포함)의 이송 가능병원 과 최종치료를 모두 어렌지하고 담당하는 당직 시스템 구축했으나 현장에서는 이송에 대한 적절한 조치와 가이드라 인이 명확치 않아서 매우 혼란스런 상황임.

Methods; 뇌졸중 초기 발생 치료 전단계 및 이송 가이드라인 1. 급성 뇌경색 환자 치료 전단계 및 이송 가이드라 인 개발 2. 급성 뇌출혈 환자 치료 전단계 및 이송 가이드라인 개발 3. 급성 뇌지주막하출혈 치료 전단계 및 이송 가 이드라인 개발

Result: 1. 뇌졸중센터 네트워크 구축: 권역심뇌혈관센터와 권역심뇌혈관센터를 중심으로 전국 뇌졸중센터 협력 네 트워크를 구축한다. 이 네트워크는 지식 공유. 협업 및 지침 개발을 위한 플랫폼 역할을 할 것입니다. 2. 다학제 태스 크포스 구성: 신경외과 의사, 신경과 전문의, 중재적 신경방사선 전문의, 응급의사, 간호사 및 재활 전문가로 구성된 다학제 태스크포스를 구성합니다. 이 태스크 포스는 포괄적인 뇌졸중 치료 지침 개발에 대한 전문 지식과 다양한 관 점을 제공할 것입니다. 3. 문헌 검토 및 근거 종합: 뇌졸중 치료와 관련된 관련 연구, 임상 시험 및 기존 지침을 식별 하기 위해 체계적인 문헌 검토를 수행합니다. 뇌졸중 치료에 대한 신경외과적 중재에 대한 증거 기반 권장 사항 개발 을 알리기 위해 증거를 종합합니다. 4. 전문가 합의 및 이해관계자 참여: 지침 개발과 관련하여 신경외과 의사 및 기 타 이해관계자 간의 합의 구축을 촉진합니다. 설문 조사, 포커스 그룹, 이해 관계자 회의를 통해 신경외과 의사를 참 여시켜 뇌졸중 치료에 대한 주요 우선 순위, 과제 및 선호 사항에 대한 의견을 수집합니다. 5. 지침 작성 및 개선: 종 합된 증거와 전문가 합의를 바탕으로 뇌졸중 치료 지침 초안을 개발합니다. 명확성, 관련성 및 실용성을 보장하기 위 해 신경외과 의사 및 기타 이해관계자의 피드백을 통해 지침을 반복적으로 개선합니다.

Conclusion: KoNES 진료지침부에서는 진료지침이사(오재상)과 연구개발위원 9인(김영덕, 김정재, 김장훈, 서동욱, 안홍석, 윤기용, 이종민, 이형진, 장경민) 의 젊은 연구자들과 함께 향후 1년간 1단계, 그 뒤 2년간 2단계 응급 뇌졸 증 치료 가이드라인을 개발한다. 이를 통해 국내 뇌졸중 치료의 가이드라인을 전문가 집단에게 공유하고자 한다.

가이드라인 설문조사 실시

- · 대상: ASCENT 참여하는 KoNES 회원
- KoNES 에서는 Prehospital 단계 급성 뇌졸중 가이드라인을 만들고자 합니다. 주제에 관련해서 평소 필요하다고 생각된 가이드라인을 적어 주십시요. 감사합니다.
- 2024 ASCENT E-poster 5 번 참조바랍니다.



KoNES

대한뇌혈관내치료의학회 회장 권순찬, 부회장 박석규, 진료지침 오재상 배상 P-6

Carotid artery stenting following CEA in acute stroke by complete ICA atherosclerotic occlusion

Sang Kyu Park

Department of Neurosurgery, Gangnam Severance Hospital, Yonsei University

Objective: A 69-year-old male patient developed left-sided hemiparesis after undergoing TKR surgery. MR imaging revealed findings consistent with right ICA occlusion-induced cerebral ischemia.

Methods: Thrombectomy and CAS were attempted, but due to complete occlusion of the ICA, the wire could not pass through, resulting in procedural failure, and neurosurgical consultation was sought.

Result: CEA was performed for carotid bulb occlusion; however, even after CEA, persistent ICA occlusion was observed, prompting intraoperative DSA. Stenosis was confirmed at the site of CEA, with multiple stenoses and thrombus observed in the distal ICA, leading to thrombectomy and ICA stent placement.

Conclusion: Finally, CAS was additionally performed at the carotid bulb site, successfully achieving ICA recanalization. The patient was immediately started on dual antiplatelet therapy, and the ICA remained patent with no progression of cerebral ischemia.

P-7

Transradial WEB Embolization of a Basilar Tip Aneurysm: A Technical Note and Literature Review

Dong-Sub Kim, Byung-Rae Cho, Young Hoon Choi, Dong-Kyu Jang

Department of Neurosurgery, Incheon St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea

Objective: The purpose of this report is that access to the vertebral artery through the Rt. radial artery is easier than access through the femoral artery when the origin of the right vertebral artery (VAO) is sharply curved.

Methods: A 61-year-old female patient presenting with 5.00 x 2.59 x 5.05mm (DNH) sized basilar tip aneurysm with multilobulated daughter sac. It was decided that the use of WEB device would be better than simple coil embolization in preventing recurrence of aneurysm.

Result: Under general anesthesia, a right radial puncture was done and a Sofia 5Fx115cm guiding catheter was positioned up to Rt. V4, and 2D and 3D DSA were performed. A working angle was set up. Aneurysm volume was calculated with AngioCalc software (www.angiocalc.com) as 44.3mm³. According to the WEB SL volume chart, the first choice was selected with a WEB SL 5x3mm (59 mm³), not a WEB SL 5x4mm (79mm³). A VIA17 microcatheter was positioned up to neck of basilar tip aneurysm. The selected WEB SL 5x3mm device was inserted into the microcatheter and deployed into the aneurysm successfully. The total procedure time was 51 minutes, which was shorter than the time required for coil embolization of an average basilar tip aneurysm. She was discharged two days later without any complications.

Conclusion: In the treatment of basilar tip aneurysms with a sharp entrance to the vertebral artery, the WEB procedure through the radial artery is thought to have advantages over the common coil embolization through the femoral artery in terms of ease of access to the aneurysm, faster procedure time, and less hemostasis time.

P-8

Histological Study of the Normal Vertebral Artery -Hypothetical Induction Site of Dissecting Aneurysms-

Su-Bin Kim¹, Dong Seong Shin², Ho Jun Yi², Bum-Tae Kim^{1,2}

¹Department of Neurosurgery, ²School of Medicine, Soonchunhyang University Bucheon Hospital

Objective: Histological evaluation of dissecting aneurysms of the cerebral arteries has suggested that defects in the internal elastic lamina (IEL) induce dissection of the arterial wall. Dissecting aneurysms occur most frequently in the vertebral artery (VA).

Methods: The present study examined sections of the normal VA to elucidate the mechanisms of arterial dissection. Bilateral VAs (24 vessels) were obtained from 12 formalin fixed cadavers who died of causes other than intracranial lesions. The VAs were detached from the VA union to the point penetrating the dura mater. The VAs were cut at 5-mm intervals from the VA union, and each segment was observed using Masson's trichrome staining for elastic fibers and its thickness was measured by NIH ImageJ (Wayne Rasband@R).

Result: There was a high incidence of IEL thinning areas at the medial wall of both VAs. The thinning of tunica media was observed/measured at the same IEL thinning wall.

Conclusion: -

МЕМО		